

## ALGÈBRE 2 INFO, printemps 2023

### Fiche TD n°1,

## SYSTEMES LINEAIRES ET CALCUL MATRICIEL

### Préambule

Il y a trois types d'exercices : d'abord, les plus importants sont encadrés. Ils seront corrigés pendant les heures de cours. Ensuite, les exercices soulignés (ou des parties d'exercices soulignées) seront corrigés par vous durant les TD (travaux dirigés), sous la direction des chargés de TD. Enfin, les exercices restants (ou les parties d'exercice restantes), non soulignés, sont plutôt du même type que les précédents, et servent à vous entraîner (soit à la maison, soit durant le TD s'il reste du temps). Les CCs seront principalement basés sur les exercices encadrés ou soulignés.

**Exercice** : Les exercices le plus importants,

Exercice : Fait pendant le TD,

Exercice : La partie soulignée faite pendant le TD,

**Exercice** : A faire à la maison.

**Exercice\*** : Pour ceux qui sont intéressés, mais pas nécessaires pour la réussite dans cet UE.

### Systemes lineaires

**Exercice 1.** Résoudre les systèmes suivants.

$$a) \begin{cases} -3x - 2y + 2z = 0 \\ -2x - y + z = 2 \\ 7x + 5y - 4z = -3 \end{cases} \quad b) \begin{cases} y + z = 5 \\ x + z = 4 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

**Exercice 2.** Résoudre les systèmes suivants.

$$a) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -x + z = -1 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x + y = 2 \\ -x + z = -1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

*Indication:* On remarque la similarité entre les deux systèmes, les résoudre simultanément.

**Exercice 3** (CC 2011). Résoudre les systèmes suivants.

$$a) \begin{cases} 2x + 3y + z = 3 \\ x + 4y + 3z = -1 \\ -3x - 2y + z = -7 \\ x - 4y - 5z = 7 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x + 2y - 4z = 2 \\ -2x + 3y + 4z = 3 \\ -3x - 3y + 6z = -3 \\ x + 2y - 2z = 2 \end{cases}$$

**Exercice** 4. Résoudre le système suivant.

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 3 \\ 9x_1 + x_2 + 4x_3 - 5x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 7x_1 + x_2 + 6x_3 - x_4 = 7 \end{cases}$$

**Exercice 5.** Résoudre les systèmes suivants.

$$a) \begin{cases} -x_2 + 2x_4 + 3x_5 & = 2 \\ -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 & = 3 \\ -x_1 + 3x_2 - x_5 & = 1 \\ 3x_1 - 2x_3 - 7x_4 - 2x_5 & = -1 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 & = 3 \\ 3x_1 - 4x_3 + x_4 & = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 & = 1 \end{cases}$$

**Exercice 6.** Résoudre les deux systèmes suivants.

$$a) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 & = -1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 6x_4 & = 4 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = -5 \\ 6x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 & = -3 \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 3x_4 & = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 4x_3 + 6x_4 & = 2 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 & = 3 \\ 6x_1 + 5x_2 - x_3 + x_4 & = 4 \end{cases}$$

**Exercice 7.**

Déterminer un polynôme à coefficients réels  $P$  de degré 2 tel que  $P(-1) = 0$ ,  $P(1) = 1$  et  $P(2) = 2$ .

### Calcul matriciel I : Multiplication et autres opérations sur les matrices

**Exercice 8.** On considère les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer  $AB \equiv A \cdot B$ , le produit de la matrice  $A$  et  $B$ . Calculer également  $BA$ . Comparer les résultats.
2. Calculer  $\text{tr}(A)$ ,  $\text{tr}(B)$ , les traces des matrices  $A$  et  $B$ . Calculer également  $\text{tr}(AB)$  et  $\text{tr}(BA)$  et comparer.
3. Calculer  $\det(A)$  et  $\det(B)$ , les déterminants de ces matrices.
4. Vérifier par le calcul explicite que  $\det(AB) = \det(BA)$ . Comparer avec  $\det(A) \cdot \det(B)$ .
5. Calculer les matrices transposées des matrices  $A$  et  $B$ , puis  $A^T \cdot B^T$  et  $\det(A^T)$ . Que peut-on remarquer en comparant avec les résultats ?

**Exercice 9.** On définit les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & -6 \end{pmatrix}; \quad C = (1 \quad 2 \quad 3); \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}; \quad E = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad F = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Parmi les quantités suivantes, dire lesquelles sont bien définies et les calculer :

$$A + B; \quad A + F; \quad A + 2F; \quad F - I_2; \quad AB; \quad BA; \quad BC; \quad CB; \quad DE; \quad AE; \quad EA; \quad AF$$

**Exercice 10.** Soient  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

1. Décider lesquelles des sommes  $A + B$ ,  $B + A$ ,  $A + C$ ,  $C + A$ ,  $A + D$ ,  $D + A$ ,  $B + C$ ,  $C + B$ ,  $B + D$ ,  $D + B$ ,  $C + D$  et  $D + C$  sont bien définies et les calculer dans ce cas.
2. Décider lesquels des produits  $AB$ ,  $BA$ ,  $AC$ ,  $CA$ ,  $AD$ ,  $DA$ ,  $BC$ ,  $CB$ ,  $BD$ ,  $DB$ ,  $CD$  et  $DC$  sont bien définies et calculer certains d'entre eux dans ce cas.

**Exercice 11.** Soient  $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$  et  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A \cdot B$  et  $B \cdot A$ .
2. Calculer  $(A + B)^2$ .
3. Calculer  $A^2 + 2AB + B^2$ . Que peut-on remarquer ?
4. Quelle est la formule générale de  $(A + B)^2$  pour  $A$  et  $B$  deux matrices carrées quelconques ?
5. Soient  $A, B \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$  deux matrices telles que  $AB = BA$ , montrer par récurrence que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$  :

$$(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}.$$

On rappelle que pour  $n, k \in \mathbb{N}$  tels que  $0 \leq k \leq n$ , on a :  $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  et que  $0! := 1$ .

**Exercice 12.** Trouver  $A$  et  $B$  des matrices telles que  $A \neq 0$ ,  $B \neq 0$  et  $A \cdot B = 0$ .

**Exercice 13.** Soient  $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .

1. Donner  $(AB)_{i,i}$  le coefficient à la ligne  $i$ , colonne  $i$  de la matrice  $AB$ .
2. En déduire la formule de  $\text{tr}(AB)$ .
3. Montrer que  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .
4. En déduire que  $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CAB)$ .
5. Si  $A$  est inversible. Montrer que  $\text{tr}(ABA^{-1}) = \text{tr}(B)$ .
6. Soient  $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  et  $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ , calculer  $\text{tr}(ABC)$  et  $\text{tr}(BAC)$ , que peut-on remarquer ?

## Calcul matriciel II : Inverses de matrices

**Exercice 14.** En utilisant des opérations élémentaires, calculer les inverses des matrices suivantes ou conclure qu'elles ne sont pas inversibles.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 14 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 15.**

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Calculer le déterminant des matrices  $A$ ,  $B$  et  $C$  et ensuite leur inverses lorsque c'est possible.  
*Indication:* Comparer la matrice  $C$  avec la matrice  $A$ .

**Exercice 16.** Soit  $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 1 \\ 7 & 5 & -4 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer l'inverse de  $A$ .
2. Réécrire le système suivant sous forme matricielle et le résoudre en utilisant  $A^{-1}$ .

$$\begin{cases} -3x - 2y + 2z = 0 \\ -2x - y + z = 2 \\ 7x + 5y - 4z = -3 \end{cases}$$

**Exercice 17.** Déterminer l'inverse de la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 18** (CC 2022). Déterminer l'inverse de la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

**Exercice 19.**

1. Soient  $A$  et  $B$  de matrices inversibles dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ .  
Montrer que  $AB$  est inversible et que  $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ .
2. Soient  $A$ ,  $B$  et  $C$  trois matrices inversibles. Donner la matrice réciproque de  $ABC$  ?
3. Soient  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice inversible et  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  une matrice telle que  $AB = \mathbb{1}_n$ .  
Montrer que  $B = A^{-1}$ .
4. Trouver  $A$  et  $B$  deux matrices telles que  $A \cdot B = \mathbb{1}$  et  $B \cdot A \neq \mathbb{1}$ .  
*Indication:* Si  $A$  et  $B$  sont des matrices carrées alors :  $A \cdot B = \mathbb{1} \iff B \cdot A = \mathbb{1}$ .

**Exercice\* 20.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ -3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. Exécuter l'algorithme de Gauss-Jordan et déterminer l'inverse de  $A$ .
2. On note  $P_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , calculer  $A_2 = P_{1,2} \cdot A$ . Que remarque-t-on ?
3. On note  $D_1(1/2) = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , calculer  $A_3 = D_1(1/2) \cdot A_2$ . Que remarque-t-on ?
4. Continuer le raisonnement avec les matrices :

$$T_{3,1}(3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, T_{3,2}(-1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } D_3(-1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. Puis avec les matrices :  $T_{1,3}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  et  $T_{1,2}(-1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .
6. En utilisant la question 3 de l'exercice 19 montrer que :

$$T_{1,2}(-1) \cdot T_{1,3}(1) \cdot D_3(-1) \cdot T_{3,2}(-1) \cdot T_{3,1}(3) \cdot D_1(1/2) \cdot P_{1,2}$$

est l'inverse de  $A$ .

**Remarque :** Ce produit revient à faire les opérations élémentaires faites sur  $A$ , sur la matrice identité, ce qui montre bien que l'algorithme de Gauss Jordan fonctionne et donne bien l'inverse de  $A$ .

## Calcul matriciel III : Puissances de matrices et applications

**Exercice 21.** Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A^n$  pour  $n = 1, 2, 3, 4$
2. Deviner une formule pour  $A^n$ ,  $n \geq 1$  et la montrer par récurrence.

**Exercice 22.** On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A^2$ ,  $A^3$  et  $A^3 - A^2 + A - \mathbb{1}_3$ .
2. Justifier que  $A$  est inversible et exprimer  $A^{-1}$  en fonction de  $A^2$ ,  $A$  et  $\mathbb{1}_3$ .

**Exercice 23** (CC1 2021). Soit  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A^n$  pour  $n = 1, 2, 3, 4$ .
2. Montrer par récurrence sur  $n$  :  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2^n - 1 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ .
3. Vérifier que  $A^2 - 3A + 2\mathbb{1}_2 = 0$ .
4. Utiliser cette formule pour montrer que  $A$  est inversible, exprimer  $A^{-1}$  en fonction de  $A$  et de  $\mathbb{1}_2$ .

**Exercice 24.** On pose  $A = \begin{pmatrix} 13 & -8 & -12 \\ 12 & -7 & -12 \\ 6 & -4 & -5 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer  $A^2$ .
2. En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n$ .
3. S'il existe, déterminer l'inverse de  $A$ .

**Exercice 25.**

Soient  $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  et  $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le déterminant de  $P$ , en déduire que  $P$  est inversible et calculer son inverse.
2. Calculer  $D = P^{-1}AP$ .
3. Calculer  $D^n$  pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ .
4. Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = PD^nP^{-1}$ .
5. On considère les suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par  $a_0 = b_0 = 1$  et la relation de récurrence :

$$\begin{cases} a_{n+1} &= -a_n - 2b_n \\ b_{n+1} &= 3a_n + 4b_n \end{cases}, \quad \text{pour tout entier } n \in \mathbb{N}.$$

(a) Montrer que, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

(b) Calculer  $a_n$  et  $b_n$  explicitement en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 26.**

Soient  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$  et  $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ .

1. Calculer le déterminant de  $P$ , en déduire que  $P$  est inversible et calculer son inverse.
2. Calculer  $D = P^{-1}AP$ .

3. Calculer  $D^n$  pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ .
4. Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n = PD^nP^{-1}$ .
5. On considère les suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par  $a_0 = b_0 = 1$  et la relation de récurrence :

$$\begin{cases} a_{n+1} &= a_n + 2b_n \\ b_{n+1} &= 4a_n + 3b_n \end{cases}, \text{ pour tout entier } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Montrer que, pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .
- (b) Calculer  $a_n$  et  $b_n$  explicitement en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 27** (CC 2022, sauf 4.).

Soient  $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$  et  $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

1. Trouver l'inverse de la matrice  $P$ .
2. Calculer  $D = P^{-1}AP$  et ensuite  $D^n$  pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ .
3. En déduire  $A^n$ .
4. On considère la suite  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définie par  $a_0 = 1$ ,  $a_1 = 4$  et la relation de récurrence :  $a_{n+1} = 5a_n - 6a_{n-1}$  pour tout entier  $n \in \mathbb{N}^*$ . Calculer  $a_n$  en fonction de  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 28.** On pose  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Déterminer une matrice  $J \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  telle que  $A = 2\mathbb{1}_3 + J$ .
2. Calculer  $J^2$ ,  $J^3$  puis, pour tout  $n \geq 4$ ,  $J^n$ .
3. En utilisant la question 5 de l'exercice 11, calculer  $A^n$  pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ .

**Exercice 29.** On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$ .

1. Justifier que  $A$  est inversible et calculer  $A^{-1}$ .
2. (a) Déterminer une matrice  $J \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$  telle que  $A = \mathbb{1}_2 + J$ .  
(b) Calculer  $J^2$ .  
(c) A l'aide de la question 5 de l'exercice 11, en déduire  $A^n$ , pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
3. On considère  $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de vecteurs de  $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$  définie par  $U_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $U_{n+1} = AU_n$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , exprimer  $U_n$  en fonction de  $n$ .

### Applications géométriques

**Exercice 30** (Alignement et déterminant). On se place sur  $\mathbb{R}^2$ .

1. On note  $O : (0, 0)$ , l'origine. Soient  $A : (x_0, y_0)$ ,  $B : (x_1, y_1)$  deux points. Montrer que  $\overrightarrow{OA}$  et  $\overrightarrow{OB}$  sont colinéaires si et seulement si :

$$\det\begin{pmatrix} x_0 & x_1 \\ y_0 & y_1 \end{pmatrix} = 0$$

2. Soient  $A : (x_0, y_0)$ ,  $B : (x_1, y_1)$ ,  $C : (x_2, y_2)$  trois points. Ils sont dit alignés si  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires. Montrer que  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés si et seulement si :

$$\det\begin{pmatrix} x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

En déduire, la forme générale de l'équation d'une droite.

3. (Ménélaüs) On considère un triangle non plat  $ABC$ . Soient  $I \in (BC)$ ,  $J \in (CA)$  et  $K \in (AB)$ .  
Montrer que  $\frac{IC}{IB} \frac{KB}{KA} \frac{JA}{JC} = 1$  si et seulement si  $I, J, K$  sont alignés.

**Exercice 31** (Interpolation et sphère). On se place sur  $\mathbb{R}^2$ . On rappelle que l'équation d'un cercle de centre  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$  et de rayon  $R > 0$  est donnée par :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2 .$$

1. Montrer que pour tout cercle, il existe  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  tels que, le cercle soit d'équation :

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 .$$

2. Réciproquement, quelles sont les conditions sur  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  pour que  $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$  soit l'équation d'un cercle ?  
3. Montrer que par trois points non-alignés passe un unique cercle. (Comment le construire à la règle et au compas ?)  
4. Comment ce résultat se généralise-t-il en dimension 3 et plus ?

**Exercice 32** (Varignon). On se place sur  $\mathbb{C}$  que l'on identifie au plan affine sur  $\mathbb{R}$ .

1. Soit  $P_0, P_1$  et  $P_2$  trois points. Montrer qu'il existe un triangle  $P'_0 P'_1 P'_2$  tel que  $P_0, P_1$  et  $P_2$  soient les milieux des cotés de ce triangle.  
2. Montrer que cela est faux lorsque l'on remplace les triangles par des quadrilatères. C'est à dire si on considère  $P_0, P_1, P_2, P_3$ . Montrer qu'il n'existe pas en général de quadrilatère  $P'_0 P'_1 P'_2 P'_3$  tel que  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$  soient les milieux des cotés de ce quadrilatère.  
3. Donner une conditions sur le quadrilatère de départ pour que cela soit vrai.  
4. Montrer que pour tout polygone  $P_0 P_1 \dots P_n$  avec  $n$  pair, il existe un polygone  $P'_0 P'_1 \dots P'_n$  dont les milieux des cotés sont  $P_0 P_1 \dots P_n$ .

**Exercice 33** (Intersection de droites et concours). On se place sur  $\mathbb{R}^2$ . Soient  $D$  et  $D'$  deux droites du plan d'équation respective

$$ax + by + c = 0$$

$$a'x + b'y + c' = 0$$

avec  $(a, b, c, a', b', c') \in \mathbb{R}^6$ ,  $(a, b) \neq (0, 0)$  et  $(a', b') \neq (0, 0)$ .

1. Quelles sont les conditions pour que  $D$  et  $D'$  s'intersectent en un point ?  
2. Dans ce cas, quelles sont les coordonnées de  $D \cap D'$  ?  
3. On considère une troisième droite  $D''$  d'équation  $a''x + b''y + c'' = 0$ . Montrer que les droites sont concourantes ou parallèles si et seulement si :

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{pmatrix} = 0$$

**Exercice 34** (Programmation linéaire). On considère le système d'inégalités suivant :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ \phantom{x_1} + 3x_2 + x_3 \leq 6 \\ x_1 \phantom{+ x_2} + x_3 \geq 0 \\ \phantom{x_1} + x_2 \phantom{+ x_3} \geq 0 \\ \phantom{x_1} \phantom{+ x_2} + x_3 \geq 0 \end{cases}$$

1. Montrer qu'il possède une solution non triviale par élimination des variables.  
2. Représenter l'ensemble des solutions.