

Feuille d'exercices n° 5

SÉRIES ENTIÈRES

Exercice 1. Rayon de convergence

Déterminer le rayon de convergence des séries entières complexes suivantes (pour $z \in \mathbb{C}$) :

- | | | |
|------------------------------|--|---|
| 1. $\sum (-1)^n (n+3)! z^n,$ | 3. $\sum \frac{(2n)!}{(n!)^2} z^n,$ | 5. $\sum (1 + 1/n)^{(n^2)} z^n,$ |
| 2. $\sum n^n z^n,$ | 4. $\sum \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} z^n,$ | 6. $\sum \frac{\ln(n)}{\sqrt{n} + 5} z^n,$ où $n \in \mathbb{N}^*.$ |

Exercice 2. Rayon de convergence

soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

- $\sum a_n z^{3n},$
- $\sum a_n 3^n z^{2n},$
- On suppose désormais $R > 0$. Montrer que la série entière $\sum \frac{a_n}{n!} z^n$ a un rayon de convergence infini.

Exercice 3. Rayon de convergence

Déterminer le rayon de convergence des séries entières complexes suivantes :

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. $\sum (-1)^n \frac{n^n}{n!} z^{4n+1},$ | 2. $\sum \frac{n!}{1.3 \dots (2n+1)} z^{2n+3}.$ | 4. $\sum z^{n!},$ |
| | 3. $\sum (1 + (-1)^n/n)^{(n^2)} z^n.$ | 5. $\sum n^n z^{n^2}.$ |

Exercice 4. Rayon de convergence

Déterminer le rayon de convergence, R , de $\sum \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) z^n$, puis étudier sa convergence pour $|z| = R$.

Exercice 5. Vrai ou Faux

Les assertions suivantes sont elles vraies ou fausses? On donnera une démonstration si elles sont vraies ou un contre-exemple si elles sont fausses.

- Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum (-1)^n a_n z^n$ ont le même rayon de convergence.
- Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum (-1)^n a_n z^n$ ont le même domaine de convergence.

Exercice 6. Série entière, calcul explicite

Calculer le rayon de convergence des séries entières associées et déterminer la valeur des sommes suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1. \sum_{n=0}^{+\infty} n^2 x^n, & 3. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n+1} x^n, & 5. \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(3 + (-1)^n)^n} x^n \\ 2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}, & 4. \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{n^2}{(n-1)(n-2)} x^n & \end{array}$$

Exercice 7. Séries entières et équation différentielle

Déterminer les séries entières dont la fonction somme est solution de

$$x^2 f''(x) - x(2x^2 - 1)f'(x) - (2x^2 + 1)f(x) = 0. \quad (1)$$

Calculer le rayon des séries entières obtenues.

Exercice 8. Série entière et équation différentielle

$$(E) \quad f''(x) - 4f(x) = 0. \quad (2)$$

On cherche f sous la forme d'une série entière : $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, et vérifiant les conditions $f(0) = 4$ et $f'(0) = 0$.

Montrer que la seule solution est donnée par $f(x) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{4^{p+1}}{(2p)!} x^{2p}$, et l'exprimer à l'aide de fonctions usuelles.

Exercice 9. Série entière et équation différentielle

On cherche le développement en série entière de $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$, pour $\alpha \in \mathbb{R}$, par la "méthode de l'équation différentielle".

1. Montrer que f est solution de l'équation différentielle

$$\alpha f(x) - (1+x)f'(x) = 0. \quad (3)$$

(Auriez-vous pu déterminer vous-même cette équation différentielle ?)

2. Déterminer les solutions de (3) développables en séries entières et préciser leur rayon de convergence.

3. Montrer que si g est solution de l'équation (3) sur un intervalle I contenu dans $] -1; +\infty[$ alors il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in I, g(x) = C(1+x)^\alpha$.

Exercice 10. Série de Taylor

Donner un exemple de fonction définie sur tout \mathbb{R} mais dont la série de Taylor ne converge pas sur tout \mathbb{R} .

Exercice 11. Série de Taylor

Exemple classique (mais un peu lourd) : la série de Taylor converge, mais **pas vers la fonction !** On considère la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \exp(-1/x^2) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n tel que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{x^{3n}} \exp(-1/x^2)$.

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$.
3. En déduire que f n'est pas développable en série entière en 0.

Exercice 12. Développements en série entière

Développer en série entière autour de 0 les fonctions suivantes et déterminer les rayons de convergence des séries entières obtenues :

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. $x \mapsto \frac{1}{x-5}$, | 5. $x \mapsto \frac{1}{(2+x)^3}$, | 8. $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 2x(\cos \alpha) + 1}$ pour $\alpha \in]0, \pi[$ fixé, |
| 2. $x \mapsto \frac{1}{1+9x^2}$, | 6. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt[5]{32-x}}$, | 9. $x \mapsto \frac{1}{(x-1)^2(x+2)}$, |
| 3. $x \mapsto \frac{1}{(1+x)^2}$, | 7. $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, | 10. $x \mapsto \ln(1+x+x^2)$. |
| 4. $x \mapsto \ln(5-x)$. | | |

Exercice 13. Développements en série entière en un point différent de 0

Développer en série entière les fonctions suivantes au point donné :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. $x \mapsto \ln(x)$ en 1 puis en 2, | 3. $x \mapsto e^x$ en $x_0 \in \mathbb{R}$, |
| 2. $x \mapsto \sin(x)$ en $\pi/4$, | 4. $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ en 2. |

Exercice 14. Pour $n \geq 1$, et $x \in \mathbb{R}$, on note

$$f_n(x) = e^{-n} \cos(n^2x),$$

puis on pose

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

1. Montrer que la série de fonctions qui définit f converge simplement sur \mathbb{R} .
2. Montrer que sa somme f est de classe \mathcal{C}^∞ , et en particulier que, pour tout $k \geq 1$:

$$f^{(2k)}(0) = (-1)^k \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-n} n^{4k}.$$

En utilisant la formule de Stirling, montrer que la série de Taylor de f en 0 a un rayon de convergence nul.

Exercice 15. Examen Janvier 2010

Montrer que l'équation différentielle

$$x^2y'' + 4xy' + (2-x^2)y - 1 = 0$$

admet une unique solution développable en série entière et déterminer le rayon de convergence de la série entière obtenue.

Exercice 16. Examen Décembre 2007

1. On considère l'équation différentielle

$$xy'' + 2y' + w^2xy = 0 \quad (4)$$

où $w \in \mathbb{R}$.

(a) Montrer qu'il existe une fonction f développable en série entière autour de 0 solution de (4) et vérifiant la condition $f(0) = 1$. Préciser le rayon de convergence de la série entière obtenue.

(b) Exprimer f à l'aide des fonctions usuelles.

N.B. : Pour les question (a) et (b), il sera conseillé de discuter des cas $w = 0$ ou non.

2. Déterminer la nature de la série numérique de terme général $u_n = \frac{n!}{n^n}$.

Exercice 17. Examen Janvier 2009

1. Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n(x) = \frac{1}{2^{nx}}$.

(a) Justifier l'existence et calculer $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x)$ pour $x > 0$.

(b) Justifier la dérivabilité de u_n pour $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que la série de fonctions $\sum u_n'$ converge normalement sur tout intervalle $[a, b]$ où $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $0 < a < b$.

(c) Calculer alors la somme de cette série pour $x > 0$.

2. Trouver le rayon de convergence R des séries entières $\sum a_n z^n$ où $(a_n)_n$ est donnée par :

(a) $a_n = \frac{n^3}{3^n}, \forall n \geq 0$,

(b) $a_n = \frac{\cos(n\theta)}{n}, \forall n \geq 1$, avec $\theta \in \mathbb{R}$.

Indication : on pourra d'abord regarder le cas où $|z| < 1$, puis raisonner par l'absurde en utilisant la série dérivée.

3. On considère l'équation différentielle suivante

$$xy'' + 3y' - 4x^3y = 0 \quad (5)$$

(a) Montrer qu'il existe une unique solution f de (5), développable en série entière autour de 0 et telle que $f(0) = 1$.

(b) Exprimer f à l'aide des fonctions élémentaires.

Exercice 18. Attention au rayon !!

Déterminer l'ensemble des fonctions développables en séries entières (au voisinage de 0) de l'équation différentielle

$$(E) : x^2y' + y = x.$$

Exercice 19. Applications des séries entières

1. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$ si $x \neq 0$ et par $f(0) = 1$. Montrer que la fonction f est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .

2. (a) Montrer que la fonction sinus cardinal définie sur \mathbb{R} par $\text{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour $x \neq 0$ et $\text{sinc}(0) = 1$ est de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} .

(b) Établir l'égalité :

$$\int_0^\pi \text{sinc}(t) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{(2n+1)!(2n+1)}.$$