
Feuille d'exercices n° 5
Applications contractantes, points fixes

Exercice 1. On considère le système d'équations

$$\begin{cases} 4x = \sin(x + y), \\ 3y = 3 + 2 \arctan(x - y). \end{cases} \quad (x, y) \in \mathbf{R}^2 \quad (1)$$

1. Déterminer une fonction $f : \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ telle que $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ soit solution de (1) si et seulement si (x, y) est un point fixe de f .
2. Montrer que f est contractante de $(\mathbf{R}^2, \|\cdot\|_1)$ dans lui-même. *On commencera par montrer les deux inégalités suivantes : pour tout $a, b \in \mathbf{R}$, $|\sin(a) - \sin(b)| \leq |a - b|$ et $|\arctan(a) - \arctan(b)| \leq |a - b|$.*
3. Montrer que le système (1) admet une unique solution dans \mathbf{R}^2 .

Exercice 2. Pour chaque choix de valeur initiale $x_0 \in \mathbf{R}$, on définit une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ en posant $x_{n+1} = x_n^2 + \sin n - 100$ pour tout $n \geq 0$.

L'objectif de l'exercice est de montrer qu'il existe un et un seul choix de x_0 pour lequel la suite (x_n) évolue dans l'intervalle $[10, 11]$.

On note $Y = \{(y_n) \in \ell^\infty \mid \forall n \in \mathbf{N}, 10 \leq y_n \leq 11\}$ et on le munit de la métrique induite par celle de ℓ^∞ .

1. Montrer que Y est un espace métrique complet.
2. Pour $(y_n) \in Y$, on pose $F((y_n)) = (z_n)$ où $z_n = \sqrt{y_{n+1} + 100 - \sin n}$ pour tout $n \geq 0$. Montrer que cette formule définit une application F de Y vers Y .
3. Montrer que F est contractante.
4. Conclure.

Exercice 3. Soit (X, d) un espace métrique complet et f une application de X vers lui-même. On suppose qu'il existe un entier $k \geq 1$ telle que la composée $f^k \stackrel{\text{def}}{=} f \circ \dots \circ f$ (k fois) soit contractante.

1. Montrer que f a au plus un point fixe.
2. Montrer que l'unique point fixe de f^k est un point fixe de f .

Exercice 4. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace de Banach et soit f une application de E vers lui-même. On suppose $\text{Id} - f$ contractante.

1. Pour chaque y de E , on note g_y l'application $\text{Id} - f + y$. En observant que l'équation $f(x) = y$ (d'inconnue x) peut se réécrire en $g_y(x) = x$, montrer que f est bijective.
2. Montrer que f^{-1} est lipschitzienne.