Groupes

1. Notions de base
2. Quotients de groupe
3. Quelques groupes particuliers
4. Actions de groupe
5. Théorèmes de Sylow

§1. Notions de base

$$xy \in G \Rightarrow x * y \in G$$

Définition

$$*: G \times G \rightarrow G \quad (x, y) \mapsto x * y$$

Un **groupe** est un ensemble non vide G avec opération $*$ interne vérifiant

1. (élément neutre) $\exists e \in G$ avec $x * e = e * x = x \quad \forall x \in G$
2. (associativité) $\forall x, y, z \in G, x * (y * z) = (x * y) * z = x * y * z$
3. (inversibilité) $\forall x \in G, \exists x' \in G$ avec $x * x' = x' * x = e$

$$(\mathbb{Z}, +) \rightarrow \text{neutre } 0$$

$\rightarrow$ "l'inverse" de a est $-a$

$$(\mathbb{R}^x, *)$$

$\rightarrow$ neutre 1

$\rightarrow$ inverse $1/a$

Remarques

- ▶ L'élément neutre et l'inverse de x (pour x donné) sont uniques
- ▶ Le groupe est abélien (commutatif) si, $\forall x, y \in G, x * y = y * x$,
- ▶ Notations usuelles : multiplicative ou additive (abélien)

$$\hookrightarrow a * b = ab = a \cdot b \quad a * b = a + b$$

Résultat. Soient $x, y, z \in G, xz = yz \implies x = y$ (simplification) et $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ (inversion inverse l'ordre)

$$(xy)^{-1}xy = y^{-1}x^{-1}xy$$

$$z^{-1} \cdot (zx = zy)$$

$\rightarrow$ z inverse de x

$$\underbrace{z^{-1}}_e z x = z^{-1} z y \Rightarrow x = y$$

Définition

Soient $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$, on pose

$$x^{-n} = (x^{-1})^n$$

$n \geq 1$

$$x^n = \begin{cases} e & \text{si } n = 0 \\ \underbrace{x \cdot x \cdots x \cdot x}_{n \text{ termes}} & \text{si } n > 0 \\ \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1} \cdot x^{-1}}_{-n \text{ termes}} & \text{si } n < 0 \end{cases}$$

Additive

$$n x = x + \dots + x$$

$$-n x = (-x) + \dots + (-x)$$

Résultat. Soient $x \in G$ et $n, m \in \mathbb{Z}$, $x^n x^m = x^{n+m}$ et $(x^n)^m = x^{nm}$

Résultat. Soient $x, z \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$, $(z x z^{-1})^n = z x^n z^{-1}$

$n \geq 1$

$$z x z^{-1} z x z^{-1} \cdots z x z^{-1}$$

Conjugué de x par z

Définition

Soit $x \in G$, le plus petit $n \geq 1$ tel que $x^n = e$ est l'ordre de x (ordre fini).
Si n n'existe pas, alors x est d'ordre infini.

Exemple: $(\mathbb{R}^x, \cdot)$ $2 \in \mathbb{R}^x$, $2^n \neq 1 \Rightarrow 2$ d'ordre infini

$$n \geq 1 \quad -1 \in \mathbb{R}^* \quad (-1)^{-1} = 1 \quad \text{d'ordre } 2$$

Définition

Soit $x \in G$, le plus petit $n \geq 1$ tel que $x^n = e$ est l'ordre de x (ordre fini).
Si n n'existe pas, alors x est d'ordre infini.

$$\Leftrightarrow n \mid t, \text{ dans } t = ns \text{ alors } x^t = (x^n)^s = e^s = e \quad \text{de } n \text{ minimal}$$

Lemme

$\Rightarrow$ On écrit $t = nq + r$ avec $0 \leq r < n$, $x^t = e$ et $x^n = e$
Soit $x \in G$ d'ordre fini $n \geq 1$. On a

► Pour $t \in \mathbb{Z}$, $x^t = e$ si et seulement si n divise t .

► Pour $l \in \mathbb{Z}$, l'ordre de x^l est fini et est égal à

$$\frac{n}{\text{PGCD}(n, l)}$$

$$(xy)^l = x^l y^l = e$$

Soit $y \in G$ d'ordre fini $m \geq 1$ tel que x et y commutent alors l'ordre de xy divise PPCM(n, m).

$$xy = yx$$

Remarque

Si le groupe G est fini alors tous les éléments de G sont d'ordre fini

$x \in G, \{x^n, n \in \mathbb{Z}\}$ fini car G fini donc il existe $n \neq m$

lets que $x^n = x^m$, donne $m > n$, alors $x^{m-n} = e$

Définition

Un **sous-groupe** est un sous-ensemble non vide stable par l'opération $*$ et l'inversion (contient forcément e)

$m-n \geq 1 \Rightarrow x$ d'ordre fini

$$H \subseteq G \quad H \neq \emptyset \Rightarrow e \in H$$

$$\forall x, y \in H \Rightarrow xy \in H$$

Sous-groupes particuliers.

- **Centre** du groupe $G : Z(G) = \{x \in G : \forall g \in G, xg = gx\}$

Note. $G = Z(G)$ ssi G est abélien.

$$\forall x \in H$$

$$x^{-1} \in H$$

- Pour H sous-groupe de G , le **centralisateur** de H :

$$Z_H(G) = \{x \in G : \forall h \in H, xh = hx\}$$

Note $H \subseteq Z_H(G)$ ssi H est abélien.

$$xhx^{-1} = h$$

$$Z(G) = Z_G(G)$$

- Pour H sous-groupe de G , le **normalisateur** de H :

$$Z_{\{e\}}(G) = G$$

Sous groupe

$$\rightarrow N_H(G) = \{x \in G : \forall h \in H, xhx^{-1} \in H\}$$

Note. $xh = hx \iff xhx^{-1} = h$ donc $Z_H(G) \subseteq N_H(G)$.

à montrer
Sous groupe

$$\langle S \rangle = \bigcap H$$

Définition

$S \neq \emptyset$

H ssp de G avec $S \subseteq H$

Soit S un partie de G , on note $\langle S \rangle$ le plus petit sous-groupe de G contenant S . On l'appelle le sous-groupe engendré par S . Si $\langle S \rangle = G$, on dit que S est générateur.

Si $S = \{g\}$, on note plutôt $\langle g \rangle$. Un groupe est monogène s'il est engendré par un seul élément.

$\hookrightarrow \exists g \in G$ tel que $G = \langle g \rangle$

Résultat. $\langle S \rangle$ est l'intersection des sous-groupes de G contenant S , c'est aussi l'ensemble des produits de la forme

$\langle S \rangle = \left\{ s_1^{a_1} s_2^{a_2} \dots s_t^{a_t} \text{ avec } t \geq 0, s_i \in S, a_i = \pm 1 \right\}$

à insérer

Proposition

$\prod_{i=1}^n s_i^{a_i}$

$t=0 \Rightarrow e$

Soit $g \in G$. Si g est d'ordre infini alors le groupe $\langle g \rangle$ est de cardinal infini. Si g est d'ordre fini égal à n , alors le cardinal de $\langle g \rangle$ est n , plus exactement

ordre g

$\langle g \rangle = \{g^0 = e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$

g d'ordre infini $\Rightarrow \forall n, m \geq 1,$

Définition

L'ordre d'un groupe G est le cardinal du groupe G . On note $|G|$.

$n \neq m \Rightarrow g^n \neq g^m$

Définition

Soient G_1 et G_2 deux groupes. Une application $f : G_1 \rightarrow G_2$ est un **morphisme** (de groupes) si, $\forall x, y \in G_1, f(xy) = f(x)f(y)$. Si, de plus, f est **bijective**, on dit que f est un **isomorphisme** et on note $G_1 \simeq G_2$. Une isomorphisme entre G et lui-même est un **automorphisme**.

Remarque

L'ensemble des automorphismes de G est un groupe pour la composition dénoté $\text{Aut}(G) = \{f: G \rightarrow G \text{ avec } f \text{ iso.}\}$

Proposition

Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors, les ensembles

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in G_1\}$$

image de f

$$\text{Ker}(f) = \{x \in G_1 \text{ tel que } f(x) = e_2\}$$

noyau de f

sont des sous-groupes de G_2 et G_1 resp. De plus, f est surjective ssi $\text{Im}(f) = G_2$ et injective ssi $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$.

Partie génératrice de $GL_n(k)$.

k corps $k = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

$\{A \in M_n(k) \mid A \text{ inversible}\}$ groupe

Matrices élémentaires $E_{i,j} = (0 \text{ partout sauf } 1 \text{ en ligne } i, \text{ colonne } j)$.

Matrices de dilatations

identique

$$\Rightarrow I_n + \lambda E_{i,i} = \text{diag}(1, \dots, 1 + \lambda, \dots, 1) \quad \text{avec } \lambda \neq -1$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 + \lambda \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Matrices de transvections

$$I_n + \lambda E_{i,j} \quad \text{avec } \lambda \neq 0, i \neq j$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & \lambda & & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

Théorème

L'ensemble des matrices de dilatation et des matrices de transvection engendre le groupe (multiplicatif) $GL_n(k)$.

Partie génératrice de $O_n(k)$.

$\cong$ sous groupes de $GL_n(k)$

transposé de M

Matrice orthogonale. $M^t M = I_n \iff M$ inversible et $M^{-1} = M^t$.

Une **Reflexion orthogonale** est (la matrice d') une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Soit H hyperplan de k^n (= s.e.v. de dim $n-1$), tout $v \in k^n$ se décompose $v = h + p$ avec $h \in H$ et $p \perp H$ (d'où $p = 0$ ou $p \notin H$). La réflexion correspondante est la fonction $v \mapsto h - p$.

Théorème

L'ensemble des réflexions orthogonales engendre le groupe (multiplicatif) $O_n(k)$ (qui est un sous-groupe de $GL_n(k)$).

$n=2$ ou $n=3$

$X, Y \in G$: on $\bar{X} \cap \bar{Y} = \emptyset$
 $\bar{X} = \bar{Y}$

2. Quotients de groupe

Notation. Pour $A \subset G$ et $g \in G$. On pose $gA = \{ga : a \in A\}$ (idem pour Ag). C'est un sous-ensemble de G .

$$Ag = \{ag : a \in A\}$$

Définition

Soit H sous-groupe de G . Relation d'équivalence sur G :

$$x \sim_H y \text{ ssi } x^{-1}y \in H \quad (\iff y^{-1}x \in H).$$

On note G/H l'ensemble quotient ou encore ensemble des classes à gauche, c'est-à-dire $G/H = \{gH : g \in G\}$.

Remarques

- ▶ On définit de même $H \backslash G$ l'ensemble des classes à droites.
- ▶ Toutes les classes ont le même cardinal qui est l'ordre de H .
- ▶ Une autre relation d'équivalence importante est $x \sim y$ si $\exists g \in G$ avec $x = gyg^{-1}$ qui donne les classes de conjugaison

$$\forall g \in G \quad \text{ord}(g) \mid |G| \text{ car } \text{ord}(g) = |\langle g \rangle| \mid |G|$$

Théorème (Lagrange)

On a $\text{card}(G/H) = \text{card}(H \backslash G)$ et $|G| = \text{card}(G/H) |H|$.

En particulier, si $|G|$ est fini, l'ordre de tout sous-groupe de G et de tout élément de G divise $|G|$.

On appelle $\text{card}(G/H)$ l'indice de H dans G .

Remarque. La réciproque est fautive en général : si d divise l'ordre de G , il n'existe pas forcément d'élément ou de sous-groupe de G d'ordre d . (Cas particulier : d premier, G cyclique).

$$\forall a \in G, a^{|G|} = e$$

Application au petit théorème de Fermat.

a premier avec p

L'ensemble $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ des classes inversibles modulo p avec p premier est un groupe multiplicatif d'ordre $p - 1$ et donc pour tout $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, on obtient $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, c'est-à-dire pour tout entier a non divisible par p

p premier

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\Leftrightarrow p \mid a^{p-1} - 1$$

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \{ \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1} \}$$

$$|(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times| = p-1$$

~~sous-groupe~~ $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Définition

H de G est **distingué** si, $N_H(G) = G$, ($\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$)

($\iff \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H \iff \forall g \in G, gHg^{-1} = H$).

On note $H \triangleleft G$

~~sous-groupe~~

$$\{ghg^{-1}, h \in H\}$$

demo.

Résultat. Le noyau d'un morphisme est un sous-groupe distingué

Résultat. L'intersection de sous-groupes distingués est un sous-groupe distingué

$$G/H = \{gH, g \in G\}$$

Théorème

Soit $H \triangleleft G$ alors G/H avec l'opération $aH \cdot bH = abH$ est un groupe et l'application de $G \rightarrow G/H$ définie par $g \mapsto gH$ est un morphisme

surjectif de **noyau H**

← groupe quotient

De plus, si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme alors on a

$$\begin{cases} G/\text{Ker}(f) \simeq \text{Im}(f) & (\text{Théorème de factorisation}) \end{cases}$$

iso.

$$g \cdot \text{Ker}(f) \mapsto f(g)$$

bié définie

$$g' \in g \cdot \text{Ker}(f)$$

$$f(g') = f(g) f(h) = f(g)$$

e

Quelques applications du théorème de factorisation

$$g^l = g^h \text{ avec } h \in \ker(f)$$

1. Reconnaître les groupes suivants :

$$S_n/A_n, \quad O_n(\mathbb{R})/SO_n(\mathbb{R}), \quad GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}), \quad \mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_+^\times.$$

2. Démontrer les isomorphismes suivants :

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq S_1, \quad \mathbb{R}^\times/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{R}_+^\times, \quad \mathbb{C}^\times/S_1 \simeq \mathbb{R}_+^\times$$

avec $S_1 = \{z \in \mathbb{C}^\times : |z| = 1\}$, le cercle trigonométrique.

Sous-groupe caractéristique

Un sous-groupe H est caractéristique dans G s'il est stable par tout automorphisme de G . On note alors $H \sqsubset G$.

1. Montrer qu'un sous-groupe caractéristique dans G est distingué.
2. Démontrer que $H \sqsubset K \sqsubset G \implies H \sqsubset G$.
3. Démontrer que $H \sqsubset K \triangleleft G \implies H \triangleleft G$.
4. Démontrer que le centre d'un groupe est toujours un sous-groupe caractéristique.
5. Soit ϕ l'application qui à $x \in G$ associe l'automorphisme intérieur i_x défini par : $\forall g \in G, i_x(g) = xgx^{-1}$. Montrer que ϕ est un morphisme de groupes. Déterminer son noyau. En déduire l'isomorphisme suivant :

$$G/Z(G) \simeq \text{Int}(G).$$

$$\downarrow$$
$$\lambda \circ \lambda_y = \lambda_{xy}$$

G simple si seul sous-groupe distingué sont $\{e\}$ et G

Définition

Soient H, K sous-groupes de G avec $H \triangleleft G$. G est produit semi-direct (interne) de H par K si une des conditions équivalentes est vérifiée

preuve
→
utile →

- ▶ $H \cap K = \{e\}$ et $G = HK = \{hk, h \in H, k \in K\}$
- ▶ Tout élément de $g \in G$ s'écrit de manière unique $g = hk$ avec $h \in H$ et $k \in K$
- ▶ $K \simeq G/H$ via la surjection canonique $k \mapsto kH$

On note $G = H \rtimes K$.

$$K \rightarrow G/H$$

$$H \triangleleft G$$

Résultat. On a aussi $G = KH$ et donc $G = K \rtimes H$.

Si on a aussi $K \triangleleft G$, on dit que c'est un produit direct.

Dans ce cas, pour tout $k \in K$ et $h \in H$, on a $kh = hk$ et l'application

$H \times K \rightarrow G$ définit par

$$(h, k) \mapsto hk$$

est un isomorphisme.

$\mathbb{Z} \rightarrow G$ morphisme

$$G \simeq H \times K = \{(h, k) \mid h \in H, k \in K\}$$

$a \mapsto a$ surj.

3. Quelques groupes particuliers

Lemme

Soit G un groupe monogène. Si G est infini alors $G \simeq \mathbb{Z}$, sinon G est cyclique et $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec n l'ordre de G .

$$\exists g \in G \text{ tel que } G = \langle g \rangle = \{g^n, n \in \mathbb{Z}\}$$

Proposition

Soit $\bar{m} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. L'ordre de $\bar{m}$ est $n / \text{PGCD}(m, n)$ donc $\bar{m}$ est générateur ssi n et m sont premiers entre eux ssi $\bar{m}$ est inversible modulo n .

↳ monogène + fini

$$g^n \neq g^m \text{ si } n \neq m$$

Définition

G d'ordre n : $g \in G$ générateur si $\text{ord}(g) = n$

L'ensemble des inversibles modulo n forme un groupe multiplicatif

générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{m} \text{ tel que } \text{PGCD}(m, n) = 1\}$$

d'ordre $\varphi(n)$ (fonction indicatrice d'Euler).

Théorème (Théorème des restes chinois)

Soient n et m deux entiers ≥ 1 et premiers entre eux, on a les isomorphismes naturels

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$$

Nombres d'éléments d'ordre donné dans un groupe cyclique

Soit G un groupe cyclique d'ordre n .

1. Soit $d \geq 1$ un entier. Déterminer le nombre d'éléments d'ordre d dans G .
2. En déduire la formule $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Le but de cet exercice est de déterminer la structure du groupe $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ des automorphismes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.

1. Déterminer l'ordre de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
2. Montrer que $\bar{7}$ est un générateur de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$. En déduire que $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$ est cyclique.
3. En déduire tous les sous-groupes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
4. Déterminer tous les générateurs de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
5. Déterminer tous les automorphismes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
6. Écrire la table de multiplication de $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ et en déduire que $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.