

## Feuille 5 : Types de raisonnements

### A. Exercices standards

#### Exercice 1 – Raisonnements par récurrence

1. Montrer que pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $5^n \geq 4^n + 3^n$ .
2. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de nombres entiers naturels définie par  $u_0 = 1$ ,  $u_1 = 3$  et  $u_{n+2} = 4u_n + u_{n+1}$ .  
Établir la propriété

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq 3^n.$$

3. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = u_1 = -1$  et  $u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer que  $u_n = 3^n - 2^{n+1}$  pour tout entier naturel  $n$ .

#### Exercice 2 – Raisonnement par récurrence forte

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Démontrer par récurrence forte que l'on a  $u_n = 2^{n-1}$  pour tout entier  $n \geq 1$ .

#### Exercice 3 – Irrationalité de $\sqrt{2}$

Le but de cet exercice est de démontrer, par l'absurde, que le nombre réel  $\sqrt{2}$  est irrationnel. Supposons donc qu'il existe deux entiers naturels non nuls  $p$  et  $q$  tels que  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ .

1. Vérifier que l'on a  $p^2 = 2q^2$ .
2. Justifier que l'on peut supposer que  $p$  et  $q$  sont premiers entre eux.
3. Démontrer que  $p$  est pair.
4. En déduire que  $q$  est pair.
5. En déduire que  $p$  et  $q$  n'existent pas.

#### Exercice 4 – Démontrer qu'une inégalité est fautive Démontrer que la proposition suivante est fautive

$$\forall x \in ]-\infty, 1[, \quad 2^{3^x} (\ln(1-x) + 1)(3x^3 + xe^x - 4) \geq 0.$$

#### Exercice 5 – Raisonnement par contraposée

On définit la proposition suivante :

$P$  : "pour tout entier  $n \geq 2$ , si l'entier  $(n^2 - 1)$  n'est pas divisible par 8 alors  $n$  est pair."

1. Déterminer la contraposée de  $P$ .
2. Montrer que tout entier impair  $n$  s'écrit  $n = 4k + r$  où  $r \in \{1, 3\}$  et  $k \in \mathbb{N}$ .  
(Indication : écrire  $n = 2p + 1$  puis faire deux cas en fonction de la parité de  $p$ .)
3. Prouver la contraposée de la proposition  $P$ . Que peut-on en déduire ?

---

## B. Exercices supplémentaires (plus difficiles)

### Exercice 6 – Différents types de raisonnements

1. Soient  $a, b \in \mathbb{R}_+$ . Montrer que si  $a \leq b$  alors  $a \leq \frac{a+b}{2} \leq b$  et  $a \leq \sqrt{ab} \leq b$ .
2. (Cas par cas) Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n(n+1)$  est divisible par 2 (distinguer les  $n$  pairs des  $n$  impairs).
3. (Contraposée ou absurde) Soient  $a, b \in \mathbb{Z}$ . Montrer que si  $b \neq 0$  alors  $a + b\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ . (On utilisera que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .)
4. (Absurde) Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . Montrer que  $\sqrt{n^2 + 1}$  n'est pas un entier.
5. (Contre-exemple) Est-ce que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , on a  $x < 2 \implies x^2 < 4$  ?
6. (Récurrence) Fixons un réel  $x \geq 0$ . Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

### Exercice 7 – Disjonction de cas et raisonnement non-constructif

Le but de cet exercice est de montrer qu'il existe  $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  et  $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  tels que  $a^b \in \mathbb{Q}$ . Pour cela, on raisonne par disjonction de cas.

1. Si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$ , déterminer des irrationnels  $a$  et  $b$  tels que  $a^b \in \mathbb{Q}$ .
2. Même question si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ .
3. Conclure.

### Exercice 8 – Somme d'irrationnels

Soit  $a$  et  $b$  deux réels. On considère la proposition suivante :

$P$  : "si  $a + b$  est irrationnel, alors  $a$  ou  $b$  sont irrationnels".

1. Quelle est la contraposée de cette  $P$  ? Démontrer  $P$ .
2. Énoncer la réciproque de  $P$ . Est-ce que cette réciproque est toujours vraie ?

---

## C. Exercices d'entraînement (à faire en autonomie)

### Exercice 9 – Raisonnement par récurrence

Soit  $(u_n)_{n \geq 2}$  la suite définie par  $u_2 = 3$  et, pour tout  $n \geq 2$ ,  $u_{n+1} = \frac{3u_n + 1}{u_n + 3}$ .

Montrer que pour tout entier  $n \geq 2$ ,  $u_n = \frac{2^n + 2}{2^n - 2}$

### Exercice 10 – Récurrence et initialisation

Pour tout nombre entier naturel  $n$ , on définit la propriété  $P(n)$  : " $2^n > n^2$ ".

1. Démontrer que, pour  $n \geq 3$ , l'implication  $P(n) \implies P(n+1)$  est vraie.
2. Pour quels entiers  $n$  la propriété  $P(n)$  est-elle vraie ?

### Exercice 11 – Raisonnements par l'absurde

Soit  $n > 0$ . Démontrer que si  $n$  est le carré d'un entier, alors  $2n$  n'est pas le carré d'un entier.

### Exercice 12 – Raisonnements par contraposée

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $M \in \mathbb{R}_+^*$  et  $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ . On considère la proposition suivante :

$P$  : "si  $\sum_{i=1}^n a_i \geq M$ , alors il existe  $i \in \{1, \dots, n\}$  tel que  $a_i \geq \frac{M}{n}$ ".

1. Énoncer la contraposée de  $P$ .
2. Démontrer  $P$ .