

Feuille 2 : Fonctions et fonctions usuelles

Exercice 1 : (Injection, surjection, bijection). Les fonctions suivantes sont-elles des injections ? Des surjections ? Des bijections ?

1. $f_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f_1(x) = x^2 + 1$.
2. $f_2 : \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty[$ définie par $f_2(x) = x^2 + 1$.
3. $f_3 : [-4, -2] \cup [0, 1] \rightarrow [1, +\infty[$, définie par $f_3(x) = x^2 + 1$.
4. $f_4 : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$, définie par $f_4(x) = \tan(x)$.
5. $f_5 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ définie par $f_5(x) = e^x$.
6. $f_6 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ définie par $f_6(x) = e^{x^2}$.

Exercice 2 : (Trinôme). Soient $a \neq 0$, b et c trois réels. On note $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

1. Rappeler les variations de f en fonction du signe de a .
2. Comment s'appelle la courbe représentative de f ? Quelle propriété de symétrie possède-t-elle ? Comment cette symétrie se traduit-elle algébriquement ?
3. Étudier le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
4. Tracer sur le même graphique une courbe représentative des fonctions $f : x \mapsto x^2$ et $g : x \mapsto \sqrt{x}$, toutes deux définies sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 3 : (Partie entière). On rappelle que l'on note $E(x)$ la partie entière d'un réel x .

1. Quelle est l'image de $\mathbb{R}$ par la fonction partie entière ?
2. Combien vaut $E(0.5)$? Et $E(-1.5)$?
3. Tracer les courbes représentatives des fonctions $x \mapsto E(x)$, $x \mapsto E(2x)$ et $x \mapsto E(x/2)$.

Exercice 4 : (Trigo). Calculer les valeurs suivantes :

1. $\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)$
2. $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)$
3. $\tan\left(-\frac{11\pi}{4}\right)$
4. $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$
5. $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Exercice 5 : (Trigo - encore). Soient x et y deux réels.

1. Exprimer les réels $\cos(x+y)$, $\cos(2x)$, $\sin(x+y)$ et $\sin(2x)$ en fonction de $\cos x$, $\sin x$, $\cos y$ et $\sin y$.
2. Montrer que $1 + \sin x = \left(\cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}\right) \right)^2$.
3. Exprimer les réels $\cos(4x)$ et $\sin(4x)$ en fonction de $\cos x$ et $\sin x$.
4. Exprimer en fonction de $\tan x$ seulement les expressions suivantes :

(a) $f_1(x) = \cos^2 x$

(b) $f_2(x) = \frac{\sin^4 x + \cos^4 x}{\sin^4 x - \cos^4 x}$

(c) $f_3(x) = \frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x - \cos x}$

(d) $f_4(x) = \cos^2 x - \sin x \cos x$.

Exercice 6 : (Trigo - toujours!).

1. Rappeler les formules d'addition de $\sin(a+b)$ et $\cos(a+b)$.
2. Résoudre l'équation, d'inconnue x : $\sin x = \frac{1}{2}$.
3. Montrer qu'il existe un réel θ tel que, pour tout réel y , $\sin(y+\theta) = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin y + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos y$.

4. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation, d'inconnue y :

$$\sin y + \cos y = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Exercice 7 : (Composition).

1. Soient I, J et K des parties de $\mathbb{R}$ et $f : J \rightarrow K$ et $g : I \rightarrow J$. Montrer que si f et g sont toutes les deux monotones, alors $f \circ g$ est également monotone. Pouvez-vous préciser son sens de variation en fonction de ceux de f et de g ?
2. Écrire les fonctions suivantes comme la composée de deux fonctions et en déduire leur sens de variation.

$$(a) \ x \mapsto (1 + 2x)^2; \quad (b) \ x \mapsto \frac{1}{1 + x^2}; \quad (c) \ x \mapsto \exp(x^2 - 1).$$

Exercice 8 : (Image directe, image réciproque). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction $x \mapsto x^2$, et E la fonction partie entière. Déterminer les ensembles suivants :

1. $f([0, 3])$.
2. $f^{-1}([0, 4])$
3. $f^{-1}([-1, 4])$
4. $f^{-1}([\sqrt{2}, 4])$
5. $\sin([0, \pi])$
6. $\sin^{-1}(\{0.5\})$
7. $\sin^{-1}([-0.5, 0.5])$
8. $\tan^{-1}([-1, 1])$.
9. $E([-1.5, 1.5])$.
10. $E^{-1}([-1, 1] \cup \{2\})$.

Exercice 9 : (Réciproque de fonctions circulaires).

1. Soit $f = \cos|_{[2\pi, 3\pi]}$, la restriction de la fonction cosinus à l'intervalle $[2\pi, 3\pi]$.
Exprimer $f^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [2\pi, 3\pi]$ en utilisant les fonctions arccos et/ou arcsin.
2. Soit $g = \cos|_{[\pi, 2\pi]}$, la restriction de la fonction cosinus à l'intervalle $[\pi, 2\pi]$.
Exprimer $g^{-1} : [-1, 1] \rightarrow [\pi, 2\pi]$ en utilisant les fonctions arccos et/ou arcsin.

Exercice 10 : (Réciproque de fonctions circulaires : Calcul). Calculez les valeurs suivantes :

1. $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$.
2. $\arcsin\left(\frac{-\sqrt{3}}{2}\right)$
3. $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
4. $\arctan(-1)$
5. $\arcsin\left(\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$
6. $\arctan\left(\tan\left(\frac{9\pi}{4}\right)\right)$
7. $\sin\left(\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}\right)\right)$
8. $\tan(\arctan(3))$.

Exercice 11 : (Dérivée). Déterminer l'ensemble des réels où f_i est dérivable et calculer sa dérivée.

1. $f_1 : x \mapsto \frac{x^3}{4}$
2. $f_2 : x \mapsto \frac{4}{x^{\frac{3}{2}}} + \sqrt{x}$
3. $f_3 : x \mapsto \sin^2 x$
4. $f_4 : x \mapsto \sin(x^2)$
5. $f_5 : x \mapsto \cos^2(3x)$
6. $f_6 : x \mapsto \tan(x^2)$
7. $f_7 : x \mapsto 3x^2 \sin(x^3)$
8. $f_8 : x \mapsto e^{2x+1}$
9. $f_9 : x \mapsto e^{x^2} \cos(3x)$
10. $f_{10} : x \mapsto \frac{1-x}{2+x}$
11. $f_{11} : x \mapsto \sqrt{1-x^2}$
12. $f_{12} : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
13. $f_{13} : x \mapsto \ln(1+x^4)$
14. $f_{14} : x \mapsto \ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|$
15. $f_{15} : x \mapsto \ln|\cos x|$

Exercice 12 : (Fonctions hyperboliques) Montrer que pour tous réels u et v , on a :

$$\cosh^2 u + \sinh^2 v = \sinh^2 u + \cosh^2 v = \cosh(u+v) \cosh(u-v)$$

$$\cosh^2 u - \sinh^2 v = \sinh^2 u - \cosh^2 v = \sinh(u+v) \sinh(u-v)$$

Exercice 13 : (Équation - Fonctions hyperboliques).

1. Calculer $\cosh\left(\frac{1}{2} \ln(3)\right)$ et $\sinh\left(\frac{1}{2} \ln(3)\right)$.

2. À l'aide de la formule de calcul du $\cosh(a+b)$, résoudre l'équation d'inconnue réelle x :

$$\frac{2}{\sqrt{3}} \cosh x + \frac{1}{\sqrt{3}} \sinh x = \cosh(5x).$$

Exercice 14 : (Limite - exp).

1. Discuter en fonction de la valeur du réel a l'existence et la valeur éventuelle de la limite de a^n quand n tend vers $+\infty$.
2. À quelle condition la fonction $x \mapsto a^x$ est-elle bien définie sur $\mathbb{R}$? Que pouvez-vous dire dans ce cas de la limite de a^x lorsque x tend vers $+\infty$?

Exercice 15 : (Limites - Opérations). Calculer, si elles existent les limites quand x tend vers $+\infty$ de :

- | | |
|---|--|
| 1. $f_1 : x \mapsto \frac{x^2 + 2x^5}{1 + x^4}$ | 5. $f_5 : x \mapsto \frac{1}{x} \ln(2x + 3)$ |
| 2. $f_2 : x \mapsto \frac{x \sin x + x^2}{1 + x^2}$ | 6. $f_6 : x \mapsto \sin \frac{1}{x}$ |
| 3. $f_3 : x \mapsto \frac{x\sqrt{x} + 5}{x^2 + \cos x}$ | 7. $f_7 : x \mapsto x + \cos x$ |
| 4. $f_4 : x \mapsto \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}$ | 8. $f_8 : x \mapsto e^{-x}(\cosh^3 x - \sinh^3 x)$ |
| | 9. $f_9 : x \mapsto x - \ln(\cosh x)$. |

Exercice 16 : (Fonction réciproque - Dérivée).

1. Montrer que pour tout y réel il existe un unique x réel tel que $y = \sinh(x)$, et exprimer x en fonction de y . $\sinh$ est donc une bijection $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$, on note sa bijection réciproque $\operatorname{argsinh}$.
2. Calculer la dérivée de $\operatorname{argsinh}$.