Feuille 4 : Limites de fonctions et Continuité

Exercice 1 (Une fonction définie par morceaux).

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par : $f(x) = \begin{cases} -2x & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 + 1 & \text{si } -1 < x \leq 0 \\ \sin(x/4) & \text{si } x > 0. \end{cases}$

- 1. Dessiner le graphe de f.
- 2. Calculer les limites suivantes :

(a)
$$\lim_{x \to -1, x < -1} f(x)$$

(c)
$$\lim_{x \to 0, x < 0} f(x)$$

(e)
$$\lim_{x \to \pi, x < \pi} f(x)$$

(a)
$$\lim_{x \to -1, x < -1} f(x)$$
(b)
$$\lim_{x \to -1, x > -1} f(x)$$

(c)
$$\lim_{x \to 0, x < 0} f(x)$$
(d)
$$\lim_{x \to 0, x > 0} f(x)$$

(f)
$$\lim_{x \to \pi, x > \pi} f(x)$$

3. Étudier les limites de f en -1, en 0 et en π .

Exercice 2 (Limites).

Calculer les limites suivantes lorsqu'elles existent :

1.
$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

7.
$$\lim_{x \to 1} |x - 1|$$

13.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin x}{x}$$

2.
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$$
3.
$$\lim_{x \to 4} \frac{2x + 5}{x - 4}$$

8.
$$\lim_{x \to 1} \frac{1}{|x-1|}$$

14.
$$\lim_{x \to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

3.
$$\lim_{x \to 4} \frac{2x+5}{x-4}$$

9.
$$\lim_{x \to 5} \frac{1}{|x-1|}$$

15.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 + \sin x}{x^2 + \cos x}$$

4.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^9 - 17}{x^7}$$

10.
$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x}-1}$$

16.
$$\lim_{x \to 0, x > 0} x^x$$

5.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^3 - 5x^2 + 7}{8 + 2x - 5x^3}$$

11.
$$\lim_{x \to 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{1}{1-x^2} \right)$$
 17. $\lim_{x \to +\infty} \frac{1+2\sin(x)}{1+\sqrt{x}}$

17.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1 + 2\sin(x)}{1 + \sqrt{x}}$$

6.
$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^2 + 3}{x^3 + 2}$$

12.
$$\lim_{x \to \infty} \sqrt{x^2 + 2x + 5} - x$$

18.
$$\lim_{x \to +\infty} e^{x-\sin x}$$

Exercice 3 (Limites et taux d'accroissement). On rappelle que $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ et que, plus généralement, si f est une fonction dérivable en x_0 , on a $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$. Calculer les limites suivantes:

$$1. \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{x}}$$

4.
$$\lim_{x \to 1/2} \frac{\cos(\pi x)}{1 - 2x}$$

4.
$$\lim_{x \to 1/2} \frac{\cos(\pi x)}{1 - 2x}$$
 7. $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{\sin^2 x}$

$$2. \lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{\sin x}$$

5.
$$\lim_{x \to 1/2} (2x^2 + x - 1) \tan(\pi x)$$
 8. $\lim_{x \to 0, x > 0} \sqrt{x} \ln^3 x$

$$8. \lim_{x \to 0, x > 0} \sqrt{x} \ln^3 x$$

3.
$$\lim_{x \to 0} \frac{\tan x}{x}$$

6.
$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x^2}$$

9.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\exp(\ln^2 x)}{x^n}, \ n \in \mathbb{Z}$$

Exercice 4 (Partie entière).

Dans cet exercice, la notation E(x) désigne la partie entière d'un réel x. Calculer :

1.
$$\lim_{x \to 0} E(x+1)$$

$$2. \lim_{x \to 0} xE\left(\frac{1}{x}\right)$$

3.
$$\lim_{x \to +\infty} xE\left(\frac{1}{x}\right)$$

Exercice 5 (Une limite à partir d'une autre).

Soit f une fonction définie sur \mathbb{R} .

1. On suppose que $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)-5}{x-2} = 5$. Déterminer $\lim_{x\to 2} f(x)$.

2. On suppose que $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} = -2$. Déterminer $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x}$.

Exercice 6 (Continuité à droite et à gauche).

Étudier la continuité à gauche, la continuité à droite et la continuité des fonctions suivantes en chaque point de leur domaine de définition.

1.
$$f:[0,2] \to \mathbb{R}$$
 définie par $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \le x \le 1\\ 2x - 1 & \text{si } 1 < x \le 2 \end{cases}$

2.
$$g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
 définie par $g(x) = x + \frac{\sqrt{x^2}}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 1$.

Exercice 7 (Limites et continuité).

- 1. Déterminer les valeurs de $k \in \mathbb{R}$ pour lesquelles f_k définie par $f_k(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ k x^2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$ est une fonction continue.
- 2. Soit $f: \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$ l'application définie par $f(x) = \frac{1+x^3}{1+x}$. Trouver une application continue $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $g|_{\mathbb{R} \setminus \{-1\}} = f$

Exercice 8 (Nombre de solutions d'une équation).

Montrer que l'équation $x^3 - 15x + 1 = 0$ a trois solutions dans l'intervalle [-4, 4].

Exercice 9 (Solution d'une équation).

Montrer que l'équation $\tan x + \frac{x}{3} = 0$ admet une unique solution sur $[3\pi/4, \pi]$.

Exercice 10 (Bijection et monotonie).

Pour tout entier $n \geq 2$, on considère la fonction $f_n : [1, +\infty[\to \mathbb{R} \text{ donnée par } f_n(x) = x^n - x - 1]$

- 1. Soit $n \geq 2$, montrer qu'il existe un unique $x_n > 1$ tel que $f_n(x_n) = 0$.
- 2. Soit $n \ge 2$, montrer que $f_{n+1}(x_n) > 0$.
- 3. En déduire que la suite $(x_n)_{n\geq 2}$ est décroissante et converge vers une limite ℓ .
- 4. On va montrer par l'absurde que $\ell = 1$. On suppose ainsi que ℓ est strictement supérieur à 1. Justifier que les suites (ℓ^n) et (x_n^n) divergent. Conclure.

Exercice 11 (Une fonction lipschtizienne).

Soient a et b deux nombres réels tels que a < b et f une application de [a, b] vers [a, b].

1. On suppose que pour tout $(x,y) \in [a,b] \times [a,b]$ on a

$$|f(x) - f(y)| \le |x - y|$$

Montrer que f est continue. En déduire qu'il existe au moins un réel $u \in [a, b]$ tel que f(u) = u. On pourra utiliser la fonction g de [a, b] vers \mathbb{R} définie par g(x) = f(x) - x.

2. On suppose maintenant que pour tout $(x,y) \in [a,b] \times [a,b]$ avec $x \neq y$ on a

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|$$

Montrer qu'il existe un unique $u \in [a, b]$ tel que f(u) = u.

Exercice 12 (Surjection).

Montrer que si f: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue telle que $\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$, alors f est surjective.

Exercice 13 (Image d'un intervalle. Vrai ou faux?).

- 1. Si f est continue sur un intervalle fermé borné [a,b] vers \mathbb{R} , alors f([a,b]) est un intervalle fermé borné.
- 2. Si f est continue sur un intervalle ouvert borné]a,b[vers $\mathbb{R},$ alors f(]a,b[) est un intervalle ouvert borné.
- 3. Si f est continue sur un intervalle ouvert borné]a,b[vers \mathbb{R} , alors f(]a,b[) est un intervalle ouvert, mais pas forcément borné.

2

4. Si f est continue sur un intervalle ouvert borné]a,b[vers \mathbb{R} , alors f(]a,b[) est un intervalle, mais pas forcément ouvert ni borné.

Exercice 14 (Fonction périodique).

- 1. Soit $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue et périodique. Montrer que f est bornée.
- 2. En utilisant le résultat précédent, calculer la limite

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x(\sin^8 x + \cos^{14} x)}.$$

Études complètes de fonctions

Exercice 15 (Fraction rationnelle).

On définit une fonction $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$$

- 1. Étudier les variations de f.
- 2. Calculer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition.
- 3. Calculer les limites en $-\infty$ et en $+\infty$ de l'expression f(x) (x+2). En déduire que la droite d'équation y = x + 2 est asymptote au graphe de f.
- 4. Déterminer la position du graphe de f par rapport à cette asymptote.
- 5. Tracer le graphe de f.

Exercice 16 (Avec un logarithme).

On note f la fonction définie sur [0,1[par $f(x)=(1-x)\ln(1-x)+x$ et g la fonction définie sur]0,1[par $g(x)=-\frac{\ln(1-x)}{x}$.

- 1. Étudier les variations de f sur [0,1[et en déduire que f est à valeurs positives.
- 2. Étudier les variations de g sur]0,1[.
- 3. Déterminer les limites éventuelles de g(x) pour x tendant vers 0 et pour x tendant vers 1.

Exercice 17 (Avec une exponentielle).

Soit f la fonction définie sur \mathbb{R} par $f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)e^{-x^2}$.

- 1. Déterminer les limites éventuelles de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
- 2. Étudier les variations de f.
- 3. Tracer sommairement la courbe représentative de f.

Exercice 18 (Fonctions trigo).

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2\sin x + \sin(2x)$.

- 1. Déterminer son ensemble de définition et sa plus petite période, et discuter sa parité. Au vu de ces informations, choisir un intervalle d'étude approprié.
- 2. Calculer sa dérivée, puis discuter du signe de celle-ci en fonction de x.
- 3. Dresser le tableau de variations de f.
- 4. Tracer la courbe représentative de f.

Exercice 19 (Limites et asymptotes).

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \frac{\ln x}{x}$.

- 1. On note g la fonction définie par $g(x) = x^2 1 + \ln x$. Dresser le tableau de variations de g, et en déduire qu'il existe un et un seul réel x_0 tel que $g(x_0) = 0$. Déterminer x_0 .
- 2. En déduire les variations de f.
- 3. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

- 4. Déterminer les asymptotes au graphe de f.
- 5. Tracer ce graphe et ses asymptotes, en veillant à faire figurer les tangentes remarquables.

Exercices supplémentaires

Exercice 20 (Encore des limites).

Calculer les limites suivantes :

1.
$$\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$$

$$4. \lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)}$$

7.
$$\lim_{x \to 1+} \ln x \ln(\ln x)$$

1.
$$\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x+5} - \sqrt{x-3}$$
 4. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(2x)}{\sin(3x)}$ 2. $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} - (x+1)$ 5. $\lim_{x \to +\infty} \ln^2 x - \sqrt{x}$ 3. $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$ 6. $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos(3x))}{\ln(\cos(2x))}$

5.
$$\lim_{x \to +\infty} \ln^2 x - \sqrt{x}$$

$$8. \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x}$$

3.
$$\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$$

6.
$$\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos(3x))}{\ln(\cos(2x))}$$

9.
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x - \sqrt{x}}{\ln x + x}$$

Exercice 21 (Limites et variations).

Soit f une fonction décroissante sur $]0; +\infty[$ telle que : $\lim_{x\to +\infty} f(x) = 0$. Démontrer que, pour tout $x\in\mathbb{R}^+$ on a l'inégalité : $f(x) \ge 0$.

Exercice 22 (Sur les fonctions périodiques).

Soit $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction périodique qui admet une limite en $+\infty$. Que peut-on dire de f?

Exercice 23 (Polynômes de degré impair).

Soit n un entier et $(a_i)_{0 \le i \le n}$ des réels. On supposera a_n non nul.

- 1. Si n est impair montrer que l'équation $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0 = 0$ admet au moins une solution réelle.
- 2. Donner un contre-exemple pour le cas où n est pair.

Exercice 24 (Continuité sur un intervalle stable).

Supposons que f est une fonction continue sur [0, 1] et que $0 \le f(x) \le 1$ pour chaque $x \in [0, 1]$. Montrer qu'il existe un $c \in \mathbb{R}$ tel que f(c) = c.

Exercice 25 (Fonction définie par intervalles).

Étudier la continuité de la fonction $f: [-2,2] \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2 \sin(\pi/x)$ si $x \neq 0$ et f(0) = 0, sur le domaine de définition.

Exercice 26 (Partie entière et continuité).

Étudier la continuité à gauche, la continuité à droite et la continuité en chaque point de son domaine de définition de la fonction : f définie sur \mathbb{R} par f(x) = xE(1/x) si $x \neq 0$ et f(0) = 1, où E dénote la partie entière.

Exercice 27 (Raccordements).

Déterminer les valeurs de $m \in \mathbb{R}$ pour lesquelles g_m définie sur $]-\infty,3]$ par $g_m(x)=x-m$ et sur $]3,+\infty[$ par g(x) = 1 - mx, est une fonction continue.

Exercice 28 (Fonctions continues à valeurs discrètes).

Quelles sont les fonctions $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continues dont l'image est contenue dans \mathbb{Z} ? dans \mathbb{Q} ?

Exercice 29 (Continuité et bornes).

Soient $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ supposée bornée et $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ supposée continue. Montrer que $g \circ f$ et $f \circ g$ sont bornées.

Exercice 30 (Continuité et valeur absolue).

Soit I un intervalle ouvert de \mathbb{R} , f et g deux fonctions définies sur I.

- 1. Soit $a \in I$. Donner une raison pour laquelle l'implication $(\lim_{x \to a} f(x) = f(a)) \Rightarrow (\lim_{x \to a} |f(x)| = |f(a)|)$ est vraie.
- 2. Remarquer que, pour tout x de I, on a $\sup(f(x), g(x)) = \frac{1}{2}(f(x) + g(x) + |f(x) g(x)|)$ et en déduire que, si f et g sont continues, alors la fonction $\sup(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f g|)$ l'est aussi.

4