


Topologie des espaces métriques

1. Espaces métriques
2. Fonctions continues
3. Compacité
4. Connexité
5. Complétude

§1.1 Topologie – Espaces métriques

Définition

Une **distance** sur un ensemble X est une fonction $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant



1. (séparation) $\forall x, y \in X, d(x, y) = 0$ ssi $x = y$
2. (symétrie) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$
3. (inégalité triangulaire) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

(X, d) est un **espace métrique**

Définition

Une **norme** sur un **espace vectoriel** X (sur $\mathbb{C}$ ou $\mathbb{R}$) est une fonction $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant

1. (séparation) $\forall x \in X, \|x\| = 0$ ssi $x = 0$
2. (homogénéité) $\forall x \in X, \forall \lambda, \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$
3. (inégalité triangulaire) $\forall x, y \in X, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

$(X, \|\cdot\|)$ est un **espace normé**

Résultat. Soit (X, d) espace métrique,

$$\forall x, y, z \in X, \quad |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Théorème

Soit $(X, \|\cdot\|)$ espace normé alors $d(x, y) = \|x - y\|$ est une distance sur X

Exemples

1. $\mathbb{R}^n$ avec la norme euclidienne $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$
2. La distance discrète sur tout ensemble X

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Définition

Deux distances d_1 et d_2 sur X sont **Lipschitz-équivalentes** s'il existe $m, M > 0$ tels que

$$\forall x, y \in X, \quad m d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq M d_1(x, y)$$

Définition

Soit (X, d) espace métrique. Pour $x \in X$ et $r \geq 0$, on pose

$$\begin{aligned} B(x, r) &= \{y \in X : d(x, y) < r\} \quad (\text{boule ouverte}) \\ \overline{B} = B_f(x, r) &= \{y \in X : d(x, y) \leq r\} \quad (\text{boule fermée}) \end{aligned}$$

Une partie A de X est **bornée** si il existe $M \geq 0$ tel que $\forall a, a' \in A$, $d(a, a') \leq M$, c'est équivalent à demander que A est contenue dans une boule. Pour $A \subseteq X$, une partie bornée, on définit son **diamètre** par

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(a, a') : a, a' \in A\}$$

Proposition


Soit (X, d_X) et (Y, d_Y) espaces métriques. Alors on peut définir les deux distances suivantes sur $X \times Y$

$$d_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = d_X(x_1, x_2) + d_Y(y_1, y_2)$$

$$d_\infty((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max\{d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2)\}$$

La distance d_∞ est la **distance produit**

Résultat. Ces deux distances sont Lipschitz-équivalentes $\leftarrow$ Exo.



$]0,1[$

Définition

Une partie A d'un espace métrique (X, d) est un **ouvert** si, pour tout $a \in A$, il existe $r > 0$ tel que $B(a, r) \subseteq A$. Le complémentaire d'un ouvert est un **fermé**.

Résultat. Une boule ouverte est un ouvert et une boule fermée est un fermé.

Théorème

Si d_1 et d_2 sont Lipschitz-équivalentes sur X alors les ouverts de (X, d_1) sont exactement les ouverts de (X, d_2) .

Théorème

La famille des ouverts de (X, d) vérifie les propriétés suivantes :

1. Toute union (arbitraire) d'ouverts est un ouvert
 2. Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert
- (Un énoncé équivalent en découle pour les fermés)

$$\frac{\bigcap_{i \in I} F_i \text{ fermé}}{\bigcup_{i=1}^n F_i \text{ fermé}}$$

Définition

La **topologie** d'un espace métrique (X, d) est l'ensemble des ouverts de X . Si A est une partie de X , la **topologie induite** est celle donnée par la restriction de d à $A \times A$.

Si (X, d_X) et (Y, d_Y) sont des espaces métriques, la **topologie produit** de $X \times Y$ est celle donnée par la distance d_∞ (max. entre d_X et d_Y)

$$\text{ouverts de } A = \left\{ \bigcup \cap A, \bigcup \text{ ouvert } X \right\}$$

$$\text{base de } \mathbb{R}: \left\{ a; b[; a < b \right\}$$

Définition

Une **base de la topologie** de (X, d) est un ensemble $\mathcal{B}$ de parties de X telles que : tout élément de $\mathcal{B}$ est ouvert et tout ouvert (non vide) de X est union (arbitraire) d'éléments de $\mathcal{B}$

Résultat. Les boules ouvertes forment une base de la topologie de (X, d)

$$\bigcup \text{ ouvert de } X : \forall x \in U, \exists B_x \text{ ouverte contenant } x \text{ et } B_x \subseteq U$$

Définition

Un espace métrique est **séparable** s'il admet une base de topologie au plus dénombrable

$$\text{donc } U = \bigcup_{x \in U} B_x$$

Définition

Soit (x_n) une suite d'éléments d'un espace métrique (X, d) . On dit (x_n) **converge** vers $\ell \in X$ si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 0 \text{ tel que } \forall n \geq N, d(x_n, \ell) \leq \epsilon$$

Résultat
 $0 \leq a \leq 1$

Résultat. La limite, si elle existe, est unique $\leftarrow \text{Exo.}$

$\forall \epsilon > 0,$

Définition

Une **suite extraite** d'une suite (x_n) d'éléments de X est une suite de la forme $(x_{f(n)})$ où $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante (et donc $\forall n, f(n) \geq n$).

$a \leq \epsilon \Rightarrow a = 0$

$$f(2) > f(1) > f(0) \Rightarrow f(2) \geq 2$$

Théorème

Toute suite de réels admet une sous-suite monotone.

Définition

Soit (x_n) une suite d'éléments d'un espace métrique (X, d) . On dit que $x \in X$ est **valeur d'adhérence** de (x_n) si, pour tout $\epsilon > 0$ et tout $N \geq 0$, $\exists n \geq N$ avec $x_n \in B(x, \epsilon)$. C'est équivalent à dire qu'il existe une sous-suite extraite de (x_n) qui converge vers x .

$\therefore \therefore \circledast x$

Théorème

Une partie A de l'espace métrique X est ouverte ssi pour toute suite (x_n) d'éléments de X qui converge vers un élément de A , $\exists N \geq 0$ tel que $\forall n \geq N$, on a $x_n \in A$

Théorème

Une partie A de l'espace métrique X est fermée ssi pour toute suite (x_n) convergente d'éléments de A , la limite est dans A

Définition

Soit A une partie de l'espace métrique X . L'intérieur de A , noté A° , est le plus grand ouvert contenu dans A . L'adhérence de A , noté $\bar{A}$, est le plus petit fermé contenant A . A est dense dans X si $\bar{A} = X$. La frontière de A , noté δA , est $\delta A = \bar{A} \setminus A^\circ$

Résultat. On a $A^\circ \subseteq A \subseteq \bar{A}$; $A^\circ = A$ ssi A est ouvert; $\bar{A} = A$ ssi A est fermé.

Théorème

On a $x \in \bar{A}$ ssi $\forall U$ ouvert contenant x , $U \cap A \neq \emptyset$ ssi il existe une suite d'éléments de A convergeant vers x

Boules ouvertes, boules fermées

Soit (X, d) un espace métrique. Soient $x \in X$ et r un réel strictement positif. On note $B(x, r)$ (resp. $B_f(x, r)$) la boule ouverte (resp. fermée) de centre x et de rayon r .

1. Montrer que la boule fermée $B_f(x, r)$ est un fermé de X .
2. Montrer que l'adhérence de $B(x, r)$ est incluse dans $B_f(x, r)$ et que l'intérieur de $B_f(x, r)$ contient $B(x, r)$.
3. On suppose dans cette question que X est un espace vectoriel normé, muni d'une norme $\| \cdot \|$. Montrer que les inclusions précédentes sont en fait des égalités.
4. Donner un exemple d'un espace métrique (X, d) pour lequel les résultats de la question 3. sont faux.

Définition

Pour $p \in [1, +\infty[$, on définit la norme $\|\cdot\|_p$ sur $\mathbb{R}^n$ par

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

et la norme $\|\cdot\|_\infty$

$$\|x\|_\infty = \max\{|x_i| : 1 \leq i \leq n\}$$

Résultat. L'inégalité triangulaire pour ces normes est l'inégalité de Minkowski

Théorème

Soient $p, q \in [1, +\infty]$. Les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire il existe $m, M > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, m \|x\|_p \leq \|x\|_q \leq M \|x\|_p$$

et donc les distances correspondantes sont Lipschitz-équivalentes

↳ topologie sur $\mathbb{R}^n$ même

$$\exists C_1, \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$\frac{1}{C} \|x\|_p \leq \|x\|_q$$

$$\leq C \|x\|_p$$

Normes sur ℓ^2

On note

$$\ell^2(\mathbb{R}) = \left\{ x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} x(n)^2 < \infty \right\}$$

or de div. ∞

et pour $x \in \ell^2(\mathbb{R})$, on pose

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x(n)^2 \right)^{1/2} \quad \text{et} \quad \|x\|_{\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x(n)|.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_{\infty}$ sont des normes sur $\ell^2(\mathbb{R})$.
2. Montrer que, pour tout $x \in \ell^2(\mathbb{R})$, $\|x\|_{\infty} \leq \|x\|_2$.
3. Les normes $\|\cdot\|_{\infty}$ et $\|\cdot\|_2$ sont-elles équivalentes ?
(Indication. considérer la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\ell^2(\mathbb{R})$ définie par : $x_k(n) = 1$ si $n \leq k$ et $x_k(n) = 0$ sinon.)

Normes sur $\mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$

On note $E = \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ et $A = \{f \in E : f(0) = 0\}$. On rappelle la définition des normes $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sur E :

$$\forall f \in E, \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [0;1]} \|f(x)\|, \quad \|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx.$$

1. Montrer que A est une partie fermée de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.
2. Soit $f \in E$. On définit pour tout $n \geq 1$,

$$f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R},$$
$$x \mapsto \begin{cases} f(1/n) nx & \text{si } 0 \leq x \leq 1/n, \\ f(x) & \text{sinon.} \end{cases}$$

2.1 Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n \in A$.

2.2 Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a

$$\|f_n - f\|_1 \leq \frac{3}{2n} \|f\|_\infty.$$

3. Montrer que A est dense dans $(E, \|\cdot\|_1)$.
4. Déterminer l'intérieur de A pour $\|\cdot\|_\infty$ puis pour $\|\cdot\|_1$.

§1.2 Fonctions continues

Définition

Une fonction $f : X \rightarrow Y$ est **continue en $x \in X$** si $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que

$$\forall x' \in X, d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$$

f est **continue sur $A \subseteq X$** si f est continue en x pour tout $x \in A$

f est **uniformément continue sur $A \subseteq X$** si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, x' \in A, d_X(x, x') < \delta \implies d_Y(f(x), f(x')) < \epsilon$$

Remarque

Définition de continuité : $\delta = \delta_{x, \epsilon}$

Définition de continuité uniforme : $\delta = \delta_\epsilon$

Définition

Soit $K > 0$. Une fonction $f : X \rightarrow Y$ est **K -lipschitzienne** si

$$\forall x, x' \in X, d_Y(f(x), f(x')) \leq K d_X(x, x')$$

Résultat. Lipschitzienne $\implies$ uniformément continue $\implies$ continue

Théorème (Autre caractérisation de la continuité)

Soit $f : X \rightarrow Y$.

- ▶ f est continue en $x \in X$ ssi pour toute suite (x_n) suite d'éléments de X de limite x , on a $\lim_n f(x_n) = f(x)$ (caractérisation séquentielle)
- ▶ f est continue sur X ssi pour tout ouvert U de Y , on a $f^{-1}(U)$ ouvert de X (caractérisation topologique)

Remarque. vérifier pour U dans une base d'ouverts de Y est suffisant

Résultat. La composée, la somme, la multiplication de fonctions continues est continue

Résultat. Deux fonctions continues qui coïncident sur un ensemble dense sont égales

A dire $\lim_n x$ or $f, g : X \rightarrow Y$ $\frac{f}{g}$ $f|_A = g|_A$
continues

Théorème

Soit $f : X \rightarrow Y \times Z$ (avec la distance d_∞). On note $f = (f_Y, f_Z)$. Alors f est continue ssi f_Y et f_Z sont continues

d'où $f(x) = \lim f(x_n)$

$x \in X, x = \lim_n a_n \quad a_n \in A$

$$= \lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a) \quad \text{continuité}$$

Définition

Soient $f : X \rightarrow Y$, $A \subseteq X$, $a \in \bar{A}$ et $b \in Y$. On dit que f tend vers b quand x tend vers a ou la limite de f en a est b , noté $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, si

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, \boxed{0 < d_X(x, a) < \delta} \implies d_Y(f(x), b) < \epsilon$$

$\rightarrow \text{dans } A$ $x \in A$

Résultat. On a $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$ ssi $\lim_n f(x_n) = b$ pour toute suite (x_n) de limite a avec $x_n \neq a \forall n$.

$\leftarrow x \in A$ $x_n \in A$

Résultat. f est continue en a ssi $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Théorème (Prolongement par continuité)

Soit $A \subseteq X$ et $f : A \rightarrow Y$. Soit $c \in \bar{A} \setminus A$ tel que $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe. On définit $g : A \cup \{c\} \rightarrow Y$ par

$$g(x) = f(x) \text{ si } x \in A \quad \text{et} \quad g(c) = \lim_{x \rightarrow c} f(x).$$

Alors, g est continue en c .

Définition

Soit (f_n) une suite de fonctions de X vers Y et soit $f : X \rightarrow Y$.

- ▶ (f_n) **converge simplement** vers f si $\forall x \in X, \lim_n f_n(x) = f(x)$, ie

$$\forall x \in X, \forall \epsilon > 0, \exists N \geq 0 \text{ tel que } \forall n \geq N, d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

- ▶ (f_n) **converge uniformément** vers f si

$$\forall \epsilon > 0, \exists N \geq 0 \text{ tel que } \forall x \in X, \forall n \geq N, d_Y(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

Théorème

Soit (f_n) une suite de fonctions continues de X vers Y qui converge uniformément vers $f : X \rightarrow Y$. Alors, f est continue.

Théorème

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application linéaire entre deux evn (espaces vectoriels normés) alors f est continue ssi f est continue en 0 ssi f est lipschitzienne ssi $\exists M > 0, \forall x \in X, \|f(x)\|_Y \leq M\|x\|_X$.

Dans ce cas, le plus petit M qui convient est la norme subordonnée de f , dénotée $\|f\|$.

Théorème

Soit $f \in \mathcal{L}(X, Y)$ (= ensemble des applications linéaires continues), on a

► $\forall x \in X, \|f(x)\|_Y \leq \|f\| \cdot \|x\|_X$

►

$$\|f\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|f(x)\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\|_X \leq 1}} \|f(x)\|_Y = \sup_{\substack{x \in X \\ \|x\|_X = 1}} \|f(x)\|_Y$$

► Soit $g \in \mathcal{L}(Y, Z)$, on a $\|g \circ f\| \leq \|g\| \|f\|$

Résultat. $\mathcal{L}(X, Y)$ avec la norme $\|\cdot\|$ est un evn

Définition

Un **homéomorphisme** entre deux espaces métriques $f : X \rightarrow Y$ est une bijection telle que f et f^{-1} sont continues. Dans ce cas, on dit que X et Y sont **homéomorphes**.

Limite pour une distance particulière

Soit d la distance usuelle sur $\mathbb{R}$: $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $d(x, y) = |x - y|$. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 1 - x & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

1. Montrer que l'application $\delta : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \delta(x, y) = |f(x) - f(y)|$$

est une distance sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer, si elle existe, la limite de la suite $\left(\frac{\sqrt{2}}{n}\right)_{n \geq 1}$ pour cette distance.

Calcul de normes d'applications linéaires.

1. On considère l'application linéaire $\phi : \mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\phi(u) = \int_0^1 x u(x) dx.$$

Calculer la norme de ϕ pour $\mathcal{C}([0; 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\| \cdot \|_{\infty}$.

Même question avec la norme $\| \cdot \|_1$.

2. On considère l'application linéaire $\psi : \mathbb{R}[X] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\psi(P) = P'(0).$$

Calculer la norme de ψ pour $\mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\| = \sup_{x \in [0; 1]} |P(x)|$.

§1.3 Compacité

Définition

Soit (X, d) un espace métrique.

► **Propriété de Borel-Lebesgue.** Soit $(U_i)_{i \in I}$ des ouverts de X tels que $\bigcup_{i \in I} U_i = X$ (recouvrement d'ouverts), il existe $I_0 \subseteq I$ fini tel que $\bigcup_{i \in I_0} U_i = X$.

► **Propriété de Bolzano-Weierstrass.** Toute suite d'éléments de X admet une sous-suite convergente.

Théorème

Ces deux propriétés sont équivalentes pour un espace métrique. Un espace avec ces propriétés est un **espace compact**

Résultat. Les compacts de $\mathbb{R}$ sont les fermés bornés

← [a; b]

Résultat. Soit X un espace compact et $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement d'ouverts de X . Alors il existe $r > 0$ tel que $\forall x \in X, \exists i \in I$ avec $B(x, r) \subseteq U_i$

Lemme de la maille

Proposition

$A \subseteq X$ A compact (a_n) de A converge vers b
 $\hookrightarrow \exists (a_{s(n)})$ seq de A $\Rightarrow b \in A$

- ▶ Un sous-espace compact d'un espace métrique est fermé
- ▶ Une intersection arbitraire de compacts est compacte
- ▶ Une union finie de compacts est compacte
- ▶ Un fermé d'un espace compact est compact $\leftarrow$ l'inv.

Théorème


1. **Borne atteinte.** Soit X compact et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors f est bornée et elle atteint ses bornes. De plus, f est uniformément continue (aussi vrai si on remplace $\mathbb{R}$ par Y métrique).
2. **Riesz.** Soit E un evn. Alors, E est de dimension finie ssi $B_f(0, 1)$ est compacte.
3. **Produit de compacts.** Le produit de deux espaces compacts avec la distance produit est un espace compact

Proposition

Soit $n \geq 1$, alors toutes les normes sur $\mathbb{R}^n$ (resp. sur $\mathbb{C}^n$) sont équivalentes

§1.4 Connexité

$$X = \emptyset \cup X$$



Définition

Soit (X, d) un espace métrique. On dit que X est **connexe** si, pour tout ouvert U et V avec $X = U \cup V$ et $U \cap V = \emptyset$, on a $(U, V) = (X, \emptyset)$ ou $(\emptyset, X)$.

$$\hookrightarrow V = X \setminus U \text{ fermé}$$

Proposition

$$A \subseteq X \text{ ouvert-fermé} \Rightarrow X \setminus A \text{ ouvert}$$

► X est connexe ssi les seuls **ouverts-fermés** sont X et $\emptyset$

► X est **connexe** ssi toute **fonction continue** $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ est **constante**

► L'**image d'un connexe** par une **fonction continue** est **connexe**

$\hookrightarrow$ métrique disc.

► Soit $A \subseteq X$ connexe et $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$ alors B connexe $\Rightarrow \bar{A}$ connexe
En particulier, l'**adhérence d'un connexe** est **connexe**

► Le produit de deux espaces **connexes** est **connexe**

$$\Rightarrow X = U \cup V \quad f|_U = 0 \quad f|_V = 1 \Rightarrow f \text{ continue}$$
$$U \cap V = \emptyset$$

$$\boxed{f} \quad f: X \rightarrow \{0,1\} \text{ continue} \quad V = f^{-1}(\{0\})$$

$$V = f^{-1}(\{1\})$$

Théorème (Connexité dans $\mathbb{R}$)

Les connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles. En conséquence, si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si I est un intervalle, alors $f(I)$ est un intervalle (théorème des valeurs intermédiaires)

Définition

Soit $x \in X$ espace métrique. La composante connexe $C(x)$ de x est la réunion des connexes de X contenant x . C'est le plus grand connexe contenant x . En particulier, $C(x)$ est fermé.


Résultat. On utilise : une union (arbitraire) de connexes d'intersection non vide est connexe



Théorème

Soient $x, y \in X$. Alors $C(x) = C(y)$ ou $C(x) \cap C(y) = \emptyset$. En particulier, X est l'union (disjointe) de composantes connexes.

$$\phi: [0,1] \rightarrow [a,b] \text{ continue avec } \phi(0) = a$$



$$\delta(1) = b$$

Définition

Un **chemin** reliant x à y avec $x, y \in X$ espace métrique est une application $\gamma: [0; 1] \rightarrow X$ continue avec $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$. (On peut remplacer $[0; 1]$ par un intervalle arbitraire $[a; b]$)

On dit que X est **connexe par arcs** si, $\forall x, y \in X$, il existe un chemin reliant x et y

Résultat. Connexe par arcs $\implies$ connexe $\longleftarrow$ Ex.

Résultat. L'image d'un **connexe par arcs** par une fonction continue est **connexe par arcs**

Ex: X, Y métrique $X \approx Y$ homéo.

Application

alors X connexe par arcs si Y connexe par arcs


Les espaces $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes

Théorème

L'adhérence de l'ensemble $\{(t, \sin(1/t)) : t \in]0; 1]\}$ est compact, connexe mais pas connexe par arcs

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$



§1.5 Complétude

Définition

Une suite (x_n) d'un espace métrique X est une **suite de Cauchy** si $\forall \epsilon > 0$, $\exists N$ tel que $\forall n, m \geq N$, on a $d(x_n, x_m) < \epsilon$

On dit que X est **complet** si toute suite de Cauchy de X est convergente

Résultat. Suite convergente $\implies$ suite de Cauchy

Résultat. Suite de Cauchy avec une sous-suite convergente est convergente (même limite)

Théorème

- ▶ *Tout fermé d'un espace complet est complet*
- ▶ *Tout sous-espace complet est fermé*
- ▶ *Tout espace métrique compact est complet*
- ▶ *Tout evn de dimension finie sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ est complet*

Proposition

linéaire continue

L'espace $\mathcal{L}(X, Y)$ avec X, Y evn et Y complet, munit de la norme subordonnée $\|\cdot\|$ est complet

Théorème (Riesz-Fischer)

Soit $p \in [1; +\infty]$. Alors $(\ell^p(\mathbb{N}), \|\cdot\|_p)$ est un evn complet avec

$$\|(u_n)\|_p = \begin{cases} (\sum_n |u_n|^p)^{1/p} & \text{si } p < +\infty \\ \sup_n |u_n| & \text{si } p = +\infty \end{cases}$$

et $\ell^p(\mathbb{N}) = \{\text{suites réelles } (u_n) \text{ avec } \|(u_n)\|_p < +\infty\}$.

Théorème

Soit X un espace métrique, il existe un unique (à isométrie près) **complété** Y de X vérifiant $X \subseteq Y$, d_X restriction de d_Y à X , Y complet et X dense dans Y .

Théorème (Prolongement des fonctions unif. continues)

Soient X et Y deux espaces métriques avec X complet. Soient $S \subseteq X$, une partie dense de X , et $f : S \rightarrow Y$ une application uniformément continue. Alors, il existe un unique prolongement de f par continuité de X vers Y .

$$X = \mathbb{R}^n \text{ ou } \mathbb{C}^n$$

Rappel Les applications linéaires continues sont uniformément continues.

Théorème (Point fixe des applications contractantes)

Soit X un espace métrique. Une application $f : X \rightarrow X$ est **contractante** s'il existe $0 < \alpha < 1$ tel que

$$\forall x, y \in X, \quad d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y).$$

Supposons que X est complet et $f : X \rightarrow X$ est contractante, alors elle admet un unique **point fixe** $x_* \in X$ avec $f(x_*) = x_*$. De plus, pour tout $x_0 \in X$, la suite (x_n) avec $x_{n+1} = f(x_n)$ tend vers x_* géométriquement, c'est-à-dire

$$\forall n \geq 0, \quad d(x_n, x_*) \leq \alpha^n d(x_0, x_*).$$

Une version faible du théorème de Picard.

Soit (X, d) un espace métrique compact et soit $f : X \rightarrow X$ une fonction telle que $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ pour tous $x, y \in X$ avec $x \neq y$.

1. Montrer que f admet au plus un point fixe.
2. Montrer qu'il existe $z \in X$ tel que $d(z, f(z)) \leq d(x, f(x))$ pour tout $x \in X$.
3. Montrer que z est l'unique point fixe de f .
4. Soit $x_0 \in X$. On définit une suite $(x_n)_{n \geq 0}$ par $x_{n+1} = f(x_n)$ pour tout $n \geq 0$.
Montrer que la suite $(d(x_n, z))_{n \geq 0}$ converge vers $\ell \geq 0$
5. Montrer que $\ell = 0$ et donc que (x_n) converge vers z .