

Groupes

1. Notions de base
2. Quotients de groupe
3. Quelques groupes particuliers
4. Actions de groupe
5. Théorèmes de Sylow

•

1. Notions de base

$$(5-3)-2 = 0$$

$$5-(3-2) = 4$$

Définition

Un **groupe** est un ensemble non vide G avec opération $*$ interne vérifiant

1. (élément neutre) $\exists e \in G$ avec $x * e = e * x = x \quad \forall x \in G$

2. (associativité) $\forall x, y, z \in G, x * (y * z) = (x * y) * z = x * y * z$

3. (inversibilité) $\forall x \in G, \exists x' \in G$ avec $x * x' = x' * x = e$

e, e' sont nuls :

$$e = e * e' = e'$$

Remarques

- L'élément neutre et l'inverse de x (pour x donné) sont uniques
- Le groupe est abélien (commutatif) si, $\forall x, y \in G, x * y = y * x$,
- Notations usuelles : multiplicative ou additive (abélien)

xy

$x+y$

Résultat Soient $x, y, z \in G, xz = yz \implies x = y$ (simplification) et $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$ (inversion inverse l'ordre)

$$xz = yz \implies xzz^{-1} = yzz^{-1} \implies x = y$$

$$(xy)^{-1}xy = y^{-1} \underbrace{x^{-1}x}_e y = y^{-1}y = e$$

Définition

Soient $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$, on pose

$$x^n = \begin{cases} e & \text{si } n = 0 \\ \underbrace{x \cdot x \cdots x \cdot x}_{n \text{ termes}} & \text{si } n > 0 \\ \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1} \cdot x^{-1}}_{-n \text{ termes}} & \text{si } n < 0 \end{cases}$$

$x^{-n} = (x^{-1})^n \leftarrow$

$\uparrow$ positif

Résultat. Soient $x \in G$ et $n, m \in \mathbb{Z}$, $x^n x^m = x^{n+m}$ et $(x^n)^m = x^{nm}$

Résultat. Soient $x, z \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$, $(zxz^{-1})^n = zx^n z^{-1}$

Définition

Soit $x \in G$, le plus petit $n \geq 1$ tel que $x^n = e$ est l'**ordre** de x (ordre fini).
Si n n'existe pas, alors x est d'**ordre infini**.

$(\mathbb{Z}, +)$ 1 ou d'ordre infini $(\mathbb{R}^*, \cdot)$

~1 sur d'ordre 2

Définition

Soit $x \in G$, le plus petit $n \geq 1$ tel que $x^n = e$ est l'**ordre** de x (ordre fini).
Si n n'existe pas, alors x est d'**ordre infini**.

$$x \text{ d'ordre } 1 \Leftrightarrow x = e$$

Lemme

Soit $x \in G$ d'ordre fini n . On a

- ▶ Pour $t \in \mathbb{Z}$, $x^t = \bar{e}$ si et seulement si n divise t .
- ▶ Pour $\ell \in \mathbb{Z}$, l'ordre de x^ℓ est fini et est égal à

$$\frac{n}{\text{PGCD}(n, \ell)}$$

$$(xy)^s = x^s y^s$$

- ▶ Soit $y \in G$ d'ordre fini m tel que x et y commutent alors l'ordre de xy divise $\text{PPCM}(n, m)$, avec égalité si $\text{PGCD}(n, m) = 1$.

Remarque

Si le groupe G est fini alors tous les éléments de G sont d'ordre fini

$\hookrightarrow x, x^2, x^3, \dots \in G$ donc il existe $s > t$ tel que
 $x^s = x^t \Rightarrow x^{s-t} = e$ avec $s-t \geq 1$

Définition

- Un **sous-groupe** est un sous-ensemble non vide stable par l'opération $*$ et l'inversion (contient forcément e)

Sous-groupes particuliers.

- **Centre** du groupe G $Z(G) = \{x \in G : \forall g \in G, xg = gx\}$

Note. $G = Z(G)$ ssi G est abélien.

- Pour H sous-groupe de G , le **centralisateur** de H :

$$Z_G(H) = \{x \in G : \forall h \in H, xh = hx\}.$$

Note. $H \subseteq Z_G(H)$ ssi H est abélien.

- Pour H sous-groupe de G , le **normalisateur** de H :

$$N_G(H) = \{x \in G : \forall h \in H, xhx^{-1} \in H\}.$$

Note. $xh = hx \iff xhx^{-1} = h$ donc $Z_G(H) \subseteq N_G(H)$.

$\Rightarrow$ x d'ordre fini
de G groupe

$$\forall x, y \in H, xy \in H, x^{-1} \in H$$

$$Z_G(\{e\}) = G$$

$$xHx^{-1} \subseteq H$$

Définition

Soit S une partie de G , on note $\langle S \rangle$ le plus petit sous-groupe de G contenant S . On l'appelle le **sous-groupe engendré** par S . Si $\langle S \rangle = G$, on dit que S est **générateur**.

Si $S = \{g\}$, on note plutôt $\langle g \rangle$. Un groupe est **monogène** s'il est engendré par un seul élément.

$\mathbb{Z}$ monogène engendré par 1

Résultat. $\langle S \rangle$ est l'intersection des sous-groupes de G contenant S , c'est aussi l'ensemble des produits de la forme

$S \neq \emptyset$.

$$s_1^{a_1} s_2^{a_2} \cdots s_t^{a_t} \text{ avec } t \geq 0, s_i \in S, a_i = \pm 1$$

*sous-groupe
contient S
...*

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{H \leq G, \\ S \subseteq H}} H$$

sous-groupe

Proposition

Soit $g \in G$. Si g est d'ordre infini alors le groupe $\langle g \rangle$ est de cardinal infini. Si g est d'ordre fini n , alors le cardinal de $\langle g \rangle$ est n , plus exactement

$$\langle g \rangle = \{g^0 = e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$$

$$\text{si } g^s = g^t$$

$$s > t$$

$$\text{alors } g^{s-t} = e$$

donc g n'a d'ordre fini

Définition

L'**ordre** d'un groupe G est le cardinal du groupe G . On note $|G|$.

Définition

Soient G_1 et G_2 deux groupes. Une application $f : G_1 \rightarrow G_2$ est un **morphisme** (de groupes) si, $\forall x, y \in G_1$, $f(xy) = f(x)f(y)$. Si, de plus, f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme** et on note $G_1 \simeq G_2$. Un isomorphisme entre G et lui-même est un **automorphisme**.

Remarque

L'ensemble des automorphismes de G est un groupe pour la composition noté $\text{Aut}(G)$.

Proposition

Soit $f : G_1 \rightarrow G_2$ un morphisme de groupes. Alors, les ensembles

$$\text{Im}(f) = \{f(x) : x \in G_1\}$$

image de f

$$\text{Ker}(f) = \{x \in G_1 \text{ tel que } f(x) = e_2\}$$

noyau de f

sont des sous-groupes de G_2 et G_1 resp. De plus, f est surjective ssi $\text{Im}(f) = G_2$ et injective ssi $\text{Ker}(f) = \{e_1\}$.

$$f(x) = f(y) \Leftrightarrow f(x)f(y)^{-1} = e_2 \Leftrightarrow f(xy^{-1}) = e_2$$

Partie génératrice de $GL_n(\mathbb{R})$.

Matrices élémentaires $E_{i,j} = (0 \text{ partout sauf } 1 \text{ en ligne } i, \text{ colonne } j)$.

Matrices de dilatations

$I_n + \lambda E_{i,i} = \text{diag}(1, \dots, 1 + \lambda, \dots, 1)$ avec $\lambda \neq -1$

partie i

$\neq$

0

Matrices de transvections

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ $I_n + \lambda E_{i,j}$ avec $\lambda \neq 0, i \neq j$

Théorème

L'ensemble des matrices de dilatation et des matrices de transvection engendre le groupe (multiplicatif) $GL_n(\mathbb{R})$.

Partie génératrice de $O_n(\mathbb{R}) = \{n \in GL_n(\mathbb{R}) \mid {}^t n = n^{-1}\}$

Matrice orthogonale $M^t M = I_n \iff M$ inversible et $M^{-1} = {}^t M$.

Une réflexion orthogonale est (la matrice d') une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan.

Soit H hyperplan de $\mathbb{R}^n$ (= s.e.v. de dim $n - 1$), tout $x \in \mathbb{R}^n$ se décompose $x = h + p$ avec $h \in H$ et $p \perp H$ (d'où $p = 0$ ou $p \notin H$). La réflexion correspondante est la fonction $x \mapsto h - p$.

Théorème

L'ensemble des réflexions orthogonales engendre le groupe (multiplicatif) $O_n(\mathbb{R})$ (qui est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$).

Cas $n=2$ ou $n=3$



2. Quotients de groupe

Notation. Pour $A \subset G$ et $g \in G$. On pose $gA = \{ga : a \in A\}$ (idem pour Ag). C'est un sous-ensemble de G .

Définition

Soit H sous-groupe de G . Relation d'équivalence sur G :

$$x \sim_H y \text{ ssi } xH = yH \quad (\iff y^{-1}x \in H).$$

On note G/H **ensemble quotient** ou encore **ensemble des classes à gauche**, c'est-à-dire $G/H = \{gH : g \in G\}$.

Remarques

- ▶ On définit de même $H \backslash G$ l'ensemble des classes à droite.
- ▶ Toutes les classes ont le même cardinal qui est l'ordre de H .
- ▶ Une autre relation d'équivalence importante est $x \sim y$ si $\exists g \in G$ avec $x = yg$ qui donne les **classes de conjugaison**

reflex. $x \sim x$
sym. $x \sim y \Rightarrow y \sim x$
transitive :
 $x \sim y, y \sim z \Rightarrow x \sim z$

$$\begin{aligned} H &\rightarrow xH \\ h &\mapsto xh \end{aligned} \text{ bij.}$$

Théorème (Lagrange)

On a $\text{card}(G/H) = \text{card}(H \backslash G)$ et $|G| = \text{card}(G/H) |H|$.

En particulier, si $|G|$ est fini, l'ordre de tout sous-groupe de G et de tout élément de G divise $|G|$.

On appelle $\text{card}(G/H)$ l'indice de H dans G .

Remarque. La réciproque est fautive en général : si d divise l'ordre de G , il n'existe pas forcément d'élément ou de sous-groupe de G d'ordre d .

(C'est vrai si d est premier, ou si G est cyclique.)

Application au petit théorème de Fermat.

L'ensemble $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ des classes inversibles modulo p avec p premier est un groupe multiplicatif d'ordre $p-1$ et donc pour tout $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, on obtient $\bar{a}^{p-1} = \bar{1}$, c'est-à-dire pour tout entier a non divisible par p

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Définition

H sous-groupe de G est **distingué** si, $N_G(H) = G$, ie

$$\forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H$$

$$(\iff \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H) \iff \forall g \in G, (gHg^{-1} = H).$$

On note $H \triangleleft G$

$$H \triangleleft G$$

$$gHg^{-1} \subseteq H \checkmark$$

$$\hookrightarrow H \subseteq gHg^{-1} \iff g^{-1}Hg \subseteq H \checkmark$$

Résultat. Le noyau d'un morphisme est un sous-groupe distingué

Résultat. L'intersection de sous-groupes distingués est un sous-groupe distingué

Théorème

Soit $H \triangleleft G$ alors G/H avec l'opération $aH \cdot bH = abH$ est un groupe et l'application de $G \rightarrow G/H$ définie par $g \mapsto gH$ est un morphisme surjectif de noyau H .

De plus, si $f : G \rightarrow G'$ est un morphisme alors on a

$$G/\text{Ker}(f) \simeq \text{Im}(f) \quad (\text{Théorème de factorisation})$$

$f: G \rightarrow G'$ morphisme $\forall g \in G, z \in \text{Ker} f$
 $f(gz g^{-1}) = f(g) f(z) f(g^{-1}) = f(g) f(g)^{-1} = e'$

Quelques applications du théorème de factorisation

1. Reconnaître les groupes suivants :

$$S_n/A_n, \quad O_n(\mathbb{R})/SO_n(\mathbb{R}), \quad GL_n(\mathbb{R})/SL_n(\mathbb{R}), \quad \mathbb{R}^\times/\mathbb{R}_+^\times.$$

2. Démontrer les isomorphismes suivants :

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{S}^1, \quad \mathbb{R}^\times/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{R}_+^\times, \quad \mathbb{C}^\times/\mathbb{S}^1 \simeq \mathbb{R}_+^\times$$

avec $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C}^\times : |z| = 1\}$, le cercle trigonométrique.

Sous-groupe caractéristique

Un sous-groupe H est caractéristique dans G s'il est stable par tout automorphisme de G . On note alors $H \sqsubset G$.

1. Montrer qu'un sous-groupe caractéristique dans G est distingué.
2. Démontrer que $H \sqsubset K \sqsubset G \implies H \sqsubset G$.
3. Démontrer que $H \sqsubset K \triangleleft G \implies H \triangleleft G$.
4. Démontrer que le centre d'un groupe est toujours un sous-groupe caractéristique.
5. Soit ϕ l'application qui à $x \in G$ associe l'automorphisme intérieur i_x défini par : $\forall g \in G, i_x(g) = xgx^{-1}$. Montrer que ϕ est un morphisme de groupes. Déterminer son noyau. En déduire l'isomorphisme suivant :

$$G/Z(G) \simeq \text{Int}(G).$$

G et G' deux groupes $G \times G'$ groupe

Définition

Soient H, K sous-groupes de G avec $H \triangleleft G$, G est **produit semi-direct** (interne) de H par K si une des conditions équivalentes est vérifiée

- ▶ $H \cap K = \{e\}$ et $G = HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$
- ▶ Tout élément de $g \in G$ s'écrit de manière unique $g = hk$ avec $h \in H$ et $k \in K$
- ▶ $K \cong G/H$ via la surjection canonique $k \mapsto kH$

On note $G = H \rtimes K$.

$$G \rightarrow G/H$$

$$(hk)^{-1} = k^{-1}h^{-1} \in ? HK$$

Résultat. On a aussi $G = KH$ et donc $G = K \rtimes H$.

Si on a aussi $K \triangleleft G$ on dit que c'est un **produit direct**.

Dans ce cas, pour tout $k \in K$ et $h \in H$, on a $kh = hk$ et l'application $H \times K \rightarrow G$ définie par

$$(h, k) \mapsto hk$$

est un isomorphisme.

$$O_n(\mathbb{R}) / SO_n(\mathbb{R}) \cong \{\pm 1\} \quad G \cong H \times K$$

$$O_n(\mathbb{R}) = SO_n(\mathbb{R}) \rtimes \langle \pm Id \rangle$$

3. Quelques groupes particuliers

Lemme

Soit G un groupe monogène. Si G est infini alors $G \simeq \mathbb{Z}$, sinon G est cyclique et $G \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ avec n l'ordre de G .

Proposition

Soit $\bar{m} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. L'ordre de $\bar{m}$ est $n/\text{PGCD}(m, n)$ donc $\bar{m}$ est générateur ssi n et m sont premiers entre eux ssi m est inversible modulo n .

Définition

L'ensemble des inversibles modulo n forme un groupe multiplicatif

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\bar{m} \text{ tel que } \text{PGCD}(m, n) = 1\}$$

d'ordre $\varphi(n)$ (fonction indicatrice d'Euler).

Théorème (Théorème des restes chinois)

Soient n et m deux entiers ≥ 1 et premiers entre eux, on a les isomorphismes naturels

$$\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^* \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$$

il existe $g \in G$ tq $\langle g \rangle = G$

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow G \quad f(a) = \overbrace{g^a}^{\text{morphisme surjectif}}$$

$$x \in \text{Ker } f \Leftrightarrow g^x = e \Leftrightarrow n \mid x$$

$$\text{ord } g = n$$

Nombres d'éléments d'ordre donné dans un groupe cyclique

Soit G un groupe cyclique d'ordre n .

1. Soit $d \geq 1$ un entier. Déterminer le nombre d'éléments d'ordre d dans G .
2. En déduire la formule $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Le but de cet exercice est de déterminer la structure du groupe $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ des automorphismes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.

1. Déterminer l'ordre de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
2. Montrer que $\bar{7}$ est un générateur de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$. En déduire que $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$ est cyclique.
3. En déduire tous les sous-groupes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
4. Déterminer tous les générateurs de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
5. Déterminer tous les automorphismes de $(\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*$.
6. Écrire la table de multiplication de $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ et en déduire que $\text{Aut}((\mathbb{Z}/22\mathbb{Z})^*)$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Définition

Soit $n \geq 1$, on appelle **groupe symétrique** sur n lettres, l'ensemble $S_n = \text{Bij}(\{1, \dots, n\})$. C'est un groupe pour la composition et son ordre est $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$.

$$(1, 4, 5) \quad \begin{matrix} 5 & \rightarrow & 1 \\ 1 & \rightarrow & 4 \\ 4 & \rightarrow & 5 \end{matrix} \quad 3, 3, 4, 4, 8 \text{ fois}$$

Exemple

Les **permutations** peuvent s'écrire de deux manières essentiellement

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 3 & 2 & 5 & 1 & 8 & 7 & 6 \end{pmatrix} \quad (\text{écriture sur deux lignes})$$

$$(1, 4, 5)(2, 3)(6, 8) \quad (\text{produit de cycles disjoints})$$

$$(1, 4, 5)(2, 3)(6, 8)$$

$$(2, 3) : 2 \leftrightarrow 3$$

Remarques

- ▶ La multiplication se fait de droite à gauche $(1, 2)(2, 3) = (1, 2, 3)$
- ▶ On a $(a_1, a_2, \dots, a_s) = (a_2, a_3, \dots, a_s, a_1) = \dots = (a_s, a_1, \dots, a_{s-1})$


Un cycle de longueur ℓ est un **ℓ -cycle** et on appelle un **2-cycle** une **transposition**.

Résultat. Les transpositions engendrent S_n .

↓ ordre 6

Lemme

L'ordre d'un ℓ -cycle est ℓ . L'ordre d'une permutation écrite comme produit de cycles disjoints est le PPCM des longueurs des cycles.

$$(1, 2)(2, 3) = (1, 2, 3)$$


Proposition

Soit $n \geq 2$. Il existe un unique morphisme $\text{sign} : S_n \rightarrow \{\pm 1\}$ non trivial.

On l'appelle la **signature**. Soit c un ℓ -cycle, on a $\text{sign}(c) = (-1)^{\ell+1}$.

Une permutation π est **paire** si $\text{sign}(\pi) = 1$ et **impaire** si $\text{sign}(\pi) = -1$.

Le groupe des permutations paires (= noyau de sign) est le **groupe alterné**, noté A_n . Son ordre est $n!/2$.

C'est le seul sous-groupe d'ordre $n!/2$ dans S_n .

Remarque

Un groupe G dont les seuls sous-groupes distingués sont $\{e\}$ et lui-même est un groupe **simple**. Le plus petit groupe simple non abélien est A_5 d'ordre 60 et pour tout $n \geq 5$, le groupe A_n est simple.

→ D_n

Soit $n \geq 3$. Le **groupe diédral** D_{2n} est le groupe des isométries du plan qui laissent globalement invariant un polygone régulier à n côtés.

C'est un groupe d'ordre $2n$ engendré par la **rotation** qui envoie un sommet sur le sommet suivant et une des **symétries axiales** passant par un des sommets.

De manière abstraite, D_{2n} est le groupe engendré par σ et τ avec les relations

$\sigma^i, \sigma^j, \tau, \sigma \tau$

$$\sigma^n = e, \quad \tau^2 = e, \quad \tau \sigma \tau = \sigma^{-1}.$$

ordre $\tau = 2$

τ ordre $\sigma = n$

On a alors

- ▶ Pour tout entier i , $\tau \sigma^i \tau = \sigma^{-i}$.
- ▶ Pour tout entier i , l'élément $\tau \sigma^i$ est d'ordre 2.
- ▶ Les éléments de D_{2n} sont exactement les éléments

$$e, \sigma, \dots, \sigma^{n-1}, \tau, \tau \sigma, \dots, \tau \sigma^{n-1}.$$



$$\tau \sigma = \sigma^{-1} \tau$$

(1) $\tau \sigma^i \neq e$ (ess) (2) $(\tau \sigma^i)^2 = \tau \sigma^i \tau \sigma^i$

4. Actions de groupe

$$= \sigma^{-i} \sigma^i = e$$

Définition

Une **action** du groupe G sur un ensemble X est la donnée d'un morphisme $\Phi : G \rightarrow \text{Bij}(X)$ (= groupe pour la composition).

En général, on écrit $g \cdot x$ plutôt que $\Phi(g)(x)$ pour $g \in G$ et $x \in X$, d'où

$$\forall x \in X, e \cdot x = x \quad \text{et} \quad \forall g, g' \in G, x \in X, (gg') \cdot x = g \cdot (g' \cdot x).$$

$$\phi_g \circ \phi_{g'}(x)$$

Définition

Pour $x \in X$, on pose

$$G \cdot x$$

► $O(x) = \Omega_x = \{g \cdot x : g \in G\}$ est l'**orbite** de x .

► $S(x) = G_x = \{g \in G \text{ tel que } g \cdot x = x\}$ est le **stabilisateur** de x
(sous-groupe de G)

$$g \in \text{noyau} \Leftrightarrow \forall x \in X$$

Le **noyau** de l'action est l'intersection des stabilisateurs.

$$g \cdot x = x$$

On note X/G l'ensemble des orbites de X .

L'action est **transitive** s'il existe une seule orbite. : $\forall x, y \in X, \exists g \in G$

L'action est **fidèle** si le noyau est trivial.

$$g \cdot x = y$$

$$\forall x, g \cdot x = x \Rightarrow g = e$$

Lemme

Soit K le noyau de l'action alors K est distingué et G/K hérite d'une action fidèle sur X

$$\bar{g} \in G/K \quad \bar{g} \cdot x = g \cdot x$$

soit $x \in X$ def.

Théorème (Cayley)

Soit G un groupe d'ordre n . Alors G est isomorphe à un sous-groupe de S_n .

Théorème (Équation aux classes)

X est partitionné par les orbites

Deux orbites sont ou bien égales, ou bien disjointes. Si de plus G et X sont finis, on a

$$\text{card}(X) = \sum_{\Omega \in X/G} \text{card}(\Omega)$$

$$X = \bigcup \Omega$$

$\Omega \in X/G$

Soit $x \in X$, on a

$$\text{card}(\Omega_x) \mid |G| \Leftarrow$$

$$\text{card}(\Omega_x) = \frac{|G|}{|G_x|}$$

Soit R un système de représentants des orbites de X , on a

$$\hookrightarrow \text{card}(X) = \sum_{x \in R} \frac{|G|}{|G_x|}$$

Surj.

$$G \rightarrow \Omega_x$$
$$g \mapsto g \cdot x$$

Quelques résultats sur les p -groupes

Un p -groupe, avec p premier, est un groupe fini dont l'ordre est une puissance (non triviale) de p .

1. Soit G un p -groupe. On montre que $Z(G)$ n'est pas réduit à $\{e\}$.

1.1 Soit X un ensemble fini sur lequel G agit. On note X^G l'ensemble des points fixes de X sous cette action. Montrer que

$$\text{card}(X) \equiv \text{card}(X^G) \pmod{p}.$$

1.2 Déterminer une action de G pour laquelle l'ensemble des points fixes est $Z(G)$, puis conclure.

2. Soit G un groupe fini. On suppose que $G/Z(G)$ est un groupe cyclique. Montrer que G est abélien.

En déduire la structure des groupes d'ordre p^2 avec p premier.

Sous-groupes d'indice p avec p plus petit facteur premier de $|G|$

1. Soit H un sous-groupe d'indice 2 dans G . Montrer que $H \triangleleft G$.
2. Soit G un groupe fini. Soit p le plus petit premier divisant $|G|$.

Soit H sous-groupe d'indice p , on montre que $H \triangleleft G$.

On considère l'action de G sur G/H par multiplication à gauche.

2.1 Montrer que cette action est transitive.

2.2 Soit K le noyau de l'action. Montrer que $K \subseteq H$.

2.3 Montrer que G/K est isomorphe à un sous-groupe de S_p .


2.4 En déduire que $H = K$ et le résultat.

Proposition (Lemme de Burnside)

On suppose G et X finis. Pour $g \in G$, on pose $X^g = \{x \in X \text{ tel que } g \cdot x = x\}$. On a

$$\text{card}(X/G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \text{card}(X^g)$$

nombre d'orbites



Problème du collier de perles.

1. Montrer qu'avec 5 perles blanches et 3 perles noires, on ne peut faire que 5 colliers différents de 8 perles.
2. Montrer que le nombre de colliers de 5 perles qu'on peut faire en utilisant des perles rouges, vertes ou bleues est 39.

5. Théorèmes de Sylow

Théorème

(avec $p \mid n$)

Soit G un groupe d'ordre n . Soit p un nombre premier. On écrit $n = p^r m$ avec $p \nmid m$.

- ▶ Il existe un sous-groupe P d'ordre p^r . On appelle un tel groupe, un p -Sylow de G
 $\hookrightarrow p$ -sous-groupe d'ordre max.
- ▶ Soient P et Q deux p -Sylow, il existe $g \in G$ tel que $Q = gPg^{-1}$ (les p -Sylow sont conjugués deux à deux)
- ▶ Soit H un p -sous-groupe de G , alors H est contenu dans un p -Sylow
- ▶ Le nombre n_p de p -Sylow vérifie $n_p \mid m$ et $n_p \equiv 1 \pmod{p}$

Corollaire (Cauchy)

Soit p premier. Un groupe G d'ordre n possède un élément d'ordre p si et seulement si p divise n

Exemple

Soit G un groupe d'ordre pq avec $p < q$ premiers. Alors, $n_q \mid p$ et $n_q \equiv 1 \pmod{q}$ d'où $n_q = 1$. Il suit qu'il existe un unique q -Sylow Q qui est distingué. Soit P un p -Sylow, on a $P \cap Q = \{e\}$ et $G = PQ$ d'où $G \cong P \times Q$

$$G = P \times Q$$

Déterminer tous les groupes d'ordre 12 à isomorphisme près.

Soit G un groupe d'ordre 12.

1. Déterminer les valeurs possibles pour n_2 et n_3 .
2. Montrer que G est abélien si et seulement si $n_2 = n_3 = 1$.
 - 2.1 On suppose que G est abélien. Montrer que G contient au moins un élément d'ordre 6 ou 12.
 - 2.2 En déduire la structure de G dans le cas abélien.
3. On suppose à présent que G n'est pas abélien. Montrer que si $n_3 \neq 1$, alors on a $n_2 = 1$.
4. On suppose que $n_3 = 4$. On considère l'action de G sur les 3-Sylow par conjugaison.
 - 4.1 Montrer que le stabilisateur d'un 3-Sylow pour cette action est lui-même.
 - 4.2 En déduire que l'action est fidèle, puis que $G \simeq A_4$.
5. ~~On suppose que $n_3 = 1$ et donc $n_2 = 3$. Montrer qu'on a dans ce cas~~

$$\del{G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \text{ ou } G \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.}$$

6. ~~(Question subsidiaire.) Montrer $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2 \simeq D_{12}$.~~