

2. Espaces vectoriels

Exercice 1 On munit \mathbb{R}^2 de l'addition habituelle :

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

et de la loi externe :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\lambda, (x_1, x_2)) &\mapsto (\lambda x_1, 0). \end{aligned}$$

A-t-on muni ainsi \mathbb{R}^2 d'une structure d'espace vectoriel sur \mathbb{R} ?

Exercice 2 Dans les cas suivants, indiquer si F est un sous-espace vectoriel de E :

1. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = 0\}$.
2. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = 1\}$.
3. $E = \mathbb{R}^2$, $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$.
4. $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$.
5. $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$.
6. $E = \mathbb{R}^3$, $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y = 2x \text{ et } z = x\}$.

Exercice 3 Etudier la dépendance linéaire des vecteurs de \mathbb{R}^2 suivants :

- a) $u = (2, -3)$, $v = (-1, 1)$; c) $u = (m + 1, -1)$, $v = (-3, m - 1)$ où $m \in \mathbb{R}$
- b) $u = (-6, 2)$, $v = (9, -3)$.

Exercice 4 Les familles de \mathbb{R}^3 suivantes sont-elles libres ou liées ?

- a) $u = (1, 1, 1)$, $v = (1, 1, -1)$.
- b) $u = (1, 0, -1)$, $v = (-1, 1, 0)$, $w = (0, -1, 1)$.
- c) $u = (1, 1, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 1)$, $z = (-1, 1, 1)$.
- d) $u = (1, 1, 1)$, $v = (2, -1, 2)$, $w = (1, -2, -1)$.
- e) $u = (10, -5, 15)$, $v = (-4, 2, -6)$.

Les familles de \mathbb{R}^3 données ci-dessus sont-elles génératrices de \mathbb{R}^3 ? Lorsque la réponse est négative, on déterminera le sous-espace engendré et sa nature géométrique.

Exercice 5 On considère les sous-ensembles de \mathbb{R}^4 suivants :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y + z + t = 0\} \\ G &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y = z + t\} \\ H &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a = b = c = d\}. \end{aligned}$$

- a) Vérifier que ce sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^4 ; donner une base et la dimension de chacun d'eux.
- b) Quelle est la dimension de $F + G$?
- c) Montrer que $\mathbb{R}^4 = F \oplus H$.

Exercice 6 On considère les sous-ensembles de \mathbb{R}^3 suivants :

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y = z = 0\}$$

$$F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = 0\}$$

$$F_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = y\}$$

$$F_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y\}.$$

- Vérifier que ce sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 ; donner une base et la dimension de chacun d'eux.
- Déterminer $F_2 + F_3$.
- Déterminer $F_2 \cap F_3$ et sa dimension. Que peut-on en déduire pour F_2 et F_3 ?
- Montrer que F_1 et F_2 sont supplémentaires.
- Montrer que F_1 et F_4 sont supplémentaires.
- Quelle remarque peut-on faire en considérant les questions d) et e) ?
- Indiquer la nature géométrique de chaque F_i .

Exercice 7 Soit $E = \mathbb{R}^3$ et F_1, F_2, F_3 sous-espaces vectoriels de E définis par

$$F_1 := \{(t, -t, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad F_2 := \{(0, t, -t) \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad F_3 := \{(t, 0, -t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

- Montrer que $F_1 \cap F_2 = \{0\}$, $F_2 \cap F_3 = \{0\}$ et $F_3 \cap F_1 = \{0\}$.
- La somme $F_1 + F_2 + F_3$ est-elle directe ? Vérifier votre réponse.

Exercice 8 Soit F le sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 engendré par $u_1 = (2, -3, 1)$ et $u_2 = (2, -2, 1)$.

- Quelle est la dimension de F ?
- Démontrer que le vecteur $u = (0, 1, 0)$ est élément de F , mais que $v = (0, 0, 1)$ ne l'est pas.
- Calculer les composantes du vecteur $w = (0, 4, 0) \in F$ dans la base (u_1, u_2) .
- Exprimer qu'un vecteur $v = (x, y, z)$ appartient F par une équation en x, y, z .
- Indiquer la nature géométrique de F .

Exercice 9 Soit $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x + y = 0 \text{ et } z = 2t\}$. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^4 et déterminer une base de E . Compléter cette base en une base de \mathbb{R}^4 .

Exercice 10

- Quelle est la dimension de \mathbb{C}^2 vu comme espace vectoriel sur \mathbb{R} ? Donner une base.
- Montrer que les vecteurs suivants de \mathbb{C}^3

$$v_1 = (1 + i, 1 + 2i, i), \quad v_2 = (2, 4 - i, -1), \quad v_3 = (0, -1 + 2i, 2 + i)$$

sont liés si \mathbb{C}^3 est considéré comme espace vectoriel sur \mathbb{C} , et sont libres si \mathbb{C}^3 est considéré comme espace vectoriel sur \mathbb{R} .

Exercice 11 Pourquoi les polynômes $1, X, X(X - 1), X(X - 1)(X - 2)$ forment-ils une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$ des polynômes à coefficients complexes de degré au plus 3 ? Exprimer X^2 et X^3 dans cette base.

Exercice 12 Soit $E := \{P \in \mathbb{R}_2[X] \mid P = \lambda + (2\lambda - 3\mu)X + \mu X^2, \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$.

Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_2[X]$ (espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 2) et en donner une base.

Exercice 13 Soit P un polynôme de degré n à coefficients réels. Montrer que P et ses n dérivées forment une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

Exercice 14 Soit $\mathbb{R}^{[a,b]} = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$ le \mathbb{R} -espace vectoriel des applications de $[a, b]$ dans \mathbb{R} . Rappeler les définitions de l'addition et de la multiplication externe sur $\mathbb{R}^{[a,b]}$ et dire lesquels de ces sous-ensembles sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^{[a,b]}$:

- $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}) = \{\text{fonctions continues } f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$;
- ensemble des applications surjectives (resp. injectives) $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;
- ensemble des applications $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $2f(a) = f(b)$;
- ensemble des applications $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(a) = f(b) + 1$.

Exercice 15 Soit E l'espace vectoriel des suites de nombres réels et $\mathcal{E} \subset E$ l'ensemble des suites vérifiant la relation de récurrence :

$$u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n \quad (n \geq 0).$$

- Montrer que \mathcal{E} est un sous-espace vectoriel de E ;
- Montrer que les suites de terme général $a_n = (-1)^n$ et $b_n = 2^n$ forment une famille libre de \mathcal{E} .
- Tenant compte du fait que les suites de \mathcal{E} sont univoquement déterminées si on connaît u_0 et u_1 , montrer que (a_n) et (b_n) forment une base de \mathcal{E} .
- Déterminer les suites de \mathcal{E} telles que $u_0 = 1$ et $u_1 = -2$.

Exercice 16

- Décrire les sous-espaces vectoriels de \mathbb{R} ; puis de \mathbb{R}^2 et \mathbb{R}^3 .
- Dans \mathbb{R}^3 donner un exemple de deux sous-espaces dont l'union n'est pas un sous-espace vectoriel.

Exercices à préparer pour les contrôles.

Exercice 17 On considère les ensembles

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z = -y\} \quad \text{et} \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y = 1\}.$$

Pour chacun, indiquer s'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^3 ou non.

Exercice 18 Soient dans \mathbb{R}^4 les vecteurs $v_1 = (1, 2, 3, 4)$ et $v_2 = (1, -2, 3, -4)$. Peut-on déterminer x et y dans \mathbb{R} pour que $(x, 1, y, 1) \in \text{Vect}\{v_1, v_2\}$? Et pour que $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}\{v_1, v_2\}$?

Exercice 19 On considère les vecteurs $u = (4, -2, 0)$, $v = (3, 0, 3)$, $w = (1, 0, 1)$, $z = (-2, 1, 0)$ dans \mathbb{R}^3 . La famille $\mathcal{F} = (u, v, w, z)$ est-elle libre ou liée? Calculer $\dim_{\mathbb{R}} \text{Vect}(u, v, w, z)$.

Exercice 20 Soient F et G les deux sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel \mathbb{R}^4 suivants :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid y = z = 0\}, \\ G &= \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2y - t = z = 0\}. \end{aligned}$$

- a) Donner une base de F , G , et $F + G$.
- b) Énoncer la formule de Grassmann et en déduire $\dim(F \cap G)$.
- c) Déterminer une base de $F \cap G$.

Exercice 21 On considère la famille de vecteurs de \mathbb{R}^3 suivante :

$$\mathcal{F} = \{v_1 = (0, 1, -1), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (0, 2, -1), v_4 = (0, 0, 1)\}.$$

- a) On pose $V = \text{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathcal{F})$. Extraire de \mathcal{F} une base de V .
- b) En déduire $\dim_{\mathbb{R}}(V)$.
- c) Exprimer qu'un vecteur (x, y, z) appartient à V par une équation en x, y, z .
- d) En déduire du point c) ou montrer directement que le vecteur $w_1 = (2, -1, 1) \notin V$.

Exercice 22 Dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[X]$, des polynômes réels de degrés au plus égal à 3, on considère la famille suivante :

$$\mathcal{V} = (P_1 = (1 + X), P_2 = (1 + X^3), P_3 = (1 - X^3)).$$

- a) Démontrer que \mathcal{V} est une famille libre.
- b) Écrire les vecteurs 1 et $3 + X^3$ comme combinaisons linéaires des vecteurs de la famille \mathcal{V} .
- c) Compléter la famille \mathcal{V} en une base de $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 23 Dans \mathbb{R}^3 on considère les deux sous-espaces vectoriels suivants :

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}, \\ G &= \text{Vect}\{(1, 0, 1), (0, 0, 1), (0, 0, 4)\}. \end{aligned}$$

- a) Déterminer une base de F et une base de G .
- b) Montrer que $F + G = \mathbb{R}^3$.
- c) La somme $F + G$ est-elle directe? Motiver votre réponse.