Feuille de TD 2

Indépendance

Toutes les variables aléatoires (v.a.) sont définies sur le même espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$.

Exercice 1. Indépendance 2 à 2, indépendance mutuelle

Soient $X, Y, Z : \Omega \longrightarrow \{0,1\}$ des variables aléatoires indépendantes de Bernoulli de lois

$$\mathbf{P}_X = \mathbf{P}_Y = \mathbf{P}_Z = (1/2)\delta_0 + (1/2)\delta_1.$$

Soit

$$A_1 := \{Y = Z\},\ A_2 := \{Z = X\},\ A_3 := \{X = Y\}.$$

1. Montrer que A_1, A_2, A_3 sont deux à deux indépendants.
2. Montrer que A_1, A_2, A_3 ne sont pas mutuellement indépendants.

Exercice 2. Indépendance des complémentaires

1. Soient A_1, A_2, A_3 des événements. Montrer que A_1, A_2, A_3 sont indépendants ssi A_1^c, A_2^c, A_3^c sont indépendants.
2. $(*)$ Soient $A_1, \ldots, A_n$ des événements. Montrer que $A_1, \ldots, A_n$ sont indépendants ssi $A_1^c, \ldots, A_n^c$ sont indépendants.

Exercice 3. Stabilité par somme

Soient X, Y deux v.a. indépendantes. Donner la loi de $X + Y$ dans les cas suivants.

1. $X \sim \mathrm{Bin}(n,p)$, $Y \sim \mathrm{Bin}(m,p)$, avec $n, m \in \mathbf{N}$, $p \in [0,1]$
2. $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$, $Y \sim \mathrm{Poisson}(\mu)$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}_+$,

Exercice 4. Indépendance et covariance

Soit $U : \Omega \longrightarrow [0,1]$ une variable aléatoire de loi uniforme. On pose

$$X = -\mathbf{1}_{[0,1/4[}(U) + \mathbf{1}_{[1/4,1/2[}(U),\quad X' = -\mathbf{1}_{[1/2,3/4[}(U) + \mathbf{1}_{[3/4,1]}(U) \text{ et } A = \{\omega \in \Omega; X(\omega) = X'(\omega)\}.$$

1. Montrer que $\mathbf{P}(A) = 0$, puis que $\mathbf{P}_X = \mathbf{P}_{X'}$.
2. Établir que $\mathbf{E}[XX'] = \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[X']$.
3. Montrer que les variables aléatoires X et X' ne sont pas indépendantes.

Exercice 5. Loi d'un couple de v.a.

1. Soient X, Y, X', Y' des v.a. telles que $(X,Y) \overset{\text{loi}}{=} (X',Y')$. Est-il vrai que $X \overset{\text{loi}}{=} X'$ et $Y \overset{\text{loi}}{=} Y'$? Que pensez-vous de la réciproque ?
2. Donner toutes les lois possibles d'un couple de v.a. (X,Y) tel que X et Y sont des variables de loi de Bernoulli(1/2).

Exercice 6.

Soit X une v.a. indépendante d'elle même. On va démontrer qu'elle est une constante $\mathbf{P}$-p.s.

1. Soit $I_n = [n, n+1[$. Montrer qu'il existe un entier $n \in \mathbb{Z}$ tel que

$$\mathbf{P}(X \in I_n) = 1.$$

   En déduire que $\mathbb{E}[X]$ existe.

2. Soit $c = \mathbb{E}[X]$, montrer que

$$\mathbb{E}[(X-c)^2] = 0.$$

3. En déduire que, pour tout $k \in \mathbf{N}^*$, on a $\mathbf{P}\left(|X-c| \geq \frac{1}{k}\right) = 0$
4. Conclure que $\mathbf{P}(X = c) = 1$.

Exercice 7.

Soient X, Y deux v.a. indépendantes. Soit $p > 0$ un réel donné, $a \in \mathbb{R}$.

1. Justifier que, pour tous réels x et y, on a $|x+y|^p \leq 2^p\left(|x|^p + |y|^p\right)$. *On pourra commencer par considérer le cas* $|x| \geq |y|$.
2. Montrer l'équivalence suivante :

$$\mathbf{E}[|X|^p] < \infty \Longleftrightarrow \mathbf{E}[|X-a|^p] < \infty.$$

3. $(*)$ Si $\mathbf{E}[|X+Y|^p] < \infty$, en déduire, à l'aide du théorème de Fubini, que

$$\mathbf{E}[|X|^p] < \infty \qquad \text{et} \qquad \mathbf{E}[|Y|^p] < \infty.$$