

---

Feuille d'exercices n° 2: Fonctions holomorphes, conditions de Cauchy-Riemann

---

**Terminologie.** Soit  $U \subset \mathbb{C}$  un ouvert,  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction et  $z_0 \in U$ . On emploiera de façon équivalente les termes :  $f$  est  $\mathbb{C}$ -dérivable en  $z_0$ ,  $f$  est dérivable en  $z_0$ . Comme  $\mathbb{C}$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, on emploiera le terme  $f$  est  $\mathbb{R}$ -différentiable en  $z_0$ . Ainsi,  $f$  est dérivable en  $z_0$  ssi  $f$  est  $\mathbb{R}$ -différentiable en  $z_0$  et satisfait aux conditions de Cauchy-Riemann en  $z_0$ .

**Exercice 1.** Soient  $f, g, h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définies par  $f(z) = \bar{z}$ ,  $g(z) = \operatorname{Re}(z)$  et  $h(z) = \operatorname{Im}(z)$ . Montrer que ces fonctions ne sont dérivables en aucun point de  $\mathbb{C}$ .

**Exercice 2.** Soit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $f(z) = \frac{z^5}{|z|^4}$  si  $z \neq 0$  et  $f(0) = 0$ . Montrer que  $f$  satisfait aux conditions de Cauchy-Riemann à l'origine mais que  $f$  n'est pas dérivable en ce point.

**Exercice 3.** Soit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  donnée par  $f(x + iy) = x^3 + iy^3$ . En quels points de  $\mathbb{C}$  la fonction  $f$  est-elle dérivable ?

**Exercice 4.** Soit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  la fonction polynomiale associée à un polynôme de  $\mathbb{C}[X]$ .

1. Montrer que  $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z \mapsto \overline{f(\bar{z})}$  est dérivable en tout point de  $\mathbb{C}$  et pour tout  $z \in \mathbb{C}$ , exprimer  $g'(z)$  en fonction de  $f$ .
2. Montrer que  $h : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ,  $z \mapsto \overline{f(z)}$  est dérivable en 0 ssi  $f'(0) = 0$ .

**Exercice 5.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $\mathbb{R}$ -différentiable sur l'ouvert  $U \subset \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ .

1. Confirmer que  $f$  est dérivable en  $z = x + iy$  ssi  $(x, y)$  est un point critique de  $f$ .  
(Un point  $(x, y)$  est dit *critique* si la différentielle  $Df(x, y)$  est nulle.)
2. Soit  $U$  le plan  $\mathbb{C}$  privé des axes réel et imaginaire.  
En quels points  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : z \mapsto e^{\operatorname{Re}(z)}$  et  $g : U \rightarrow \mathbb{C} : x+iy \mapsto x^2+y^2+\frac{1}{x^2y^2}$  sont-elles dérivables ?

**Exercice 6.** Soit  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorphe. On note  $\tilde{f}$  la fonction correspondante de  $\mathbb{R}^2$  vers  $\mathbb{R}^2$ . Montrer qu'en tout point  $(x, y)$  de  $\mathbb{R}^2$  tel que  $f'(x + iy) \neq 0$ , la différentielle  $D\tilde{f}(x, y)$  est une similitude directe (i.e. composée d'une homothétie et d'une rotation).

**Exercice 7.** Soit  $U$  un ouvert connexe et  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction holomorphe. Démontrer que chacune des conditions suivantes implique que  $f$  est constante.

1.  $f'$  est nulle sur  $U$ .
2.  $\operatorname{Re}(f)$  est constante.
3.  $\operatorname{Im}(f)$  est constante.
4.  $\overline{f}$  est holomorphe sur  $U$ .
5.  $|f|$  est constante.

**Exercice 8.** Soit  $U \subset \mathbb{C}$  un ouvert et  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  une fonction. On dit que  $f$  est anti-holomorphe sur  $U$  si la fonction  $z \mapsto f(\bar{z})$  est holomorphe sur l'ouvert conjugué  $\bar{U}$ .

1. Montrer que  $f$  est holomorphe sur  $U$  ssi  $\bar{f}$  est anti-holomorphe sur  $U$ .
2. Soit  $U$  un ouvert tel que  $\bar{U} = U$  et soit  $g$  une fonction anti-holomorphe sur  $U$ . Montrer qu'il existe deux fonctions holomorphes  $f_1$  et  $f_2$  sur  $U$  telles que pour tout  $z \in U$ ,  $g(z) = \bar{f}_1(z) = f_2(\bar{z})$ .

**Exercice 9.** Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  holomorphe et de classe  $\mathcal{C}^2$  sur l'ouvert  $U$  de  $\mathbb{C}$ .

1. Montrer que  $\operatorname{Re}(f)$  et  $\operatorname{Im}(f)$  sont harmoniques.  
(Une fonction  $g : U \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$  est dite *harmonique* si  $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0$ .)
2. Soit  $U$  le demi-plan ouvert  $\{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) > 0\}$ . Montrer que la fonction  $g : U \rightarrow \mathbb{R} : z \mapsto \ln|z|$  est harmonique. Montrer (en l'explicitant) qu'il existe  $f : U \rightarrow \mathbb{C}$  holomorphe sur  $U$  telle que  $\operatorname{Re}(f) = g$ .
3. On suppose à présent  $U$  étoilé. Démontrer que toute fonction  $g$  harmonique sur  $U$  est la partie réelle d'une fonction holomorphe sur  $U$ . (Considérer  $h = \frac{\partial g}{\partial x} - i \frac{\partial g}{\partial y}$  et se servir d'une primitive.)