

Calculs d'intégrales

Analyse 2, printemps 2026

Polynômes trigonométriques

On cherche à intégrer des sommes de fonctions de la forme $\cos^n(x) \sin^m(x)$.

Polynômes trigonométriques

On cherche à intégrer des sommes de fonctions de la forme $\cos^n(x) \sin^m(x)$.

Si n ou m est impair, on fait un changement de variables. Par exemple si $m = 2k + 1$ on écrit

$\sin^m(x) = \sin^{2k}(x) \sin(x) = (1 - \cos^2(x))^k \sin(x)$ et on pose $u = \cos(x)$.

Polynômes trigonométriques

Un exemple : $\sin^7(x) \cos^{12}(x)$

Polynômes trigonométriques

Un exemple : $\sin^7(x) \cos^{12}(x)$

$$\begin{aligned}\int_0^t \sin^7(x) \cos^{12}(x) dx &= \int_0^t (1 - \cos^2(x))^3 \cos^{12}(x) (\sin(x) dx) \\ &= \int_1^{\cos(t)} (1 - u^2)^3 u^{12} (-du) \\ &= \int_{\cos(t)}^1 (1 - 3u^2 + 3u^4 - u^6) u^{12} du \\ &= \left[\frac{u^{13}}{13} - \frac{3u^{15}}{15} + \frac{3u^{17}}{17} - \frac{u^{19}}{19} \right]_{\cos(t)}^1 \\ &= \frac{1}{13} - \frac{1}{5} + \frac{3}{17} - \frac{1}{19} - \frac{\cos^{13}(t)}{13} + \frac{\cos^{15}(t)}{15} - \frac{3 \cos^{17}(t)}{17} + \frac{\cos^{19}(t)}{19} \\ &= \frac{16}{20995} - \frac{\cos^{13}(t)}{13} + \frac{\cos^{15}(t)}{15} - \frac{3 \cos^{17}(t)}{17} + \frac{\cos^{19}(t)}{19}.\end{aligned}$$

Polynômes trigonométriques

Si jamais n et m sont tous les deux pairs, alors pour intégrer $\cos^n(x) \sin^m(x)$ on doit linéariser, par exemple en passant par \mathbb{C} .

Polynômes trigonométriques

Si jamais n et m sont tous les deux pairs, alors pour intégrer $\cos^n(x) \sin^m(x)$ on doit linéariser, par exemple en passant par \mathbb{C} .

Un exemple : $\cos^4(x)$.

Polynômes trigonométriques

Si jamais n et m sont tous les deux pairs, alors pour intégrer $\cos^n(x) \sin^m(x)$ on doit linéariser, par exemple en passant par \mathbb{C} .

Un exemple : $\cos^4(x)$.

$$\begin{aligned}\int_0^t \cos^4(x) dx &= \int_0^t \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4 dx \\ &= \int_0^t \frac{e^{4ix} + 4e^{3ix}e^{-ix} + 6e^{2ix}e^{-2ix} + 4e^{ix}e^{-3ix} + e^{-4ix}}{16} dx \\ &= \int_0^t \frac{e^{4ix} + e^{-4ix} + 4(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 6}{16} dx \\ &= \int_0^t \frac{2 \cos(4x) + 8 \cos(2x) + 6}{16} dx \\ &= \frac{\sin(4t)}{32} + \frac{\sin(2t)}{4} + \frac{3t}{8} .\end{aligned}$$

Fractions rationnelles

Pour trouver des primitives de fractions rationnelles :

Fractions rationnelles

Pour trouver des primitives de fractions rationnelles :

- On commence par décomposer en éléments simples.

Fractions rationnelles

Pour trouver des primitives de fractions rationnelles :

- On commence par décomposer en éléments simples.
- Puis on intègre séparément chacun des éléments simples.

Fractions rationnelles

- Un élément simple de la forme $\frac{1}{(x - a)}$ s'intègre sous la forme $\ln(|x - a|) + C$.

Fractions rationnelles

• Un élément simple de la forme $\frac{1}{(x-a)}$ s'intègre sous la forme $\ln(|x-a|) + C$.

• $\frac{1}{(x-a)^n}$ avec $n \geq 2$ s'intègre sous la forme $\frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C$.

Fractions rationnelles

- Un élément simple de la forme $\frac{1}{(x-a)}$ s'intègre sous la forme $\ln(|x-a|) + C$.
- $\frac{1}{(x-a)^n}$ avec $n \geq 2$ s'intègre sous la forme $\frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C$.
- Pour intégrer $\frac{1}{P(x)}$ où P est de degré 2 sans racines réelle, on se ramène (avec un changement de variable $u = x + \alpha$) à $\frac{1}{x^2 + a^2}$ avec $a > 0$; et cela s'intègre sous la forme $\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$.

Fractions rationnelles

- Un élément simple de la forme $\frac{1}{(x-a)}$ s'intègre sous la forme $\ln(|x-a|) + C$.
- $\frac{1}{(x-a)^n}$ avec $n \geq 2$ s'intègre sous la forme $\frac{-1}{(n-1)(x-a)^{n-1}} + C$.
- Pour intégrer $\frac{1}{P(x)}$ où P est de degré 2 sans racines réelles, on se ramène (avec un changement de variable $u = x + \alpha$) à $\frac{1}{x^2 + a^2}$ avec $a > 0$; et cela s'intègre sous la forme $\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$.
- $\frac{x}{x^2 + 1}$ s'intègre en $\ln(x^2 + 1) + C$, et $\frac{x}{(x^2 + 1)^{n+1}}$ ($n \geq 1$) s'intègre en $\frac{-1}{2n(x^2 + 1)^n}$.

Fractions rationnelles

Un seul type d'élément simple est difficile à intégrer : $\frac{1}{P(x)^n}$, où P est un polynôme de degré 2 sans racine réelles.

Fractions rationnelles

Un seul type d'élément simple est difficile à intégrer : $\frac{1}{P(x)^n}$, où P est un polynôme de degré 2 sans racine réelles.

On se ramène à $\frac{1}{(1+x^2)^n}$ par un changement de variables.

Fractions rationnelles

Un seul type d'élément simple est difficile à intégrer : $\frac{1}{P(x)^n}$, où P est un polynôme de degré 2 sans racine réelles.

On se ramène à $\frac{1}{(1+x^2)^n}$ par un changement de variables.

Puis c'est compliqué ; une méthode est de faire baisser le degré en utilisant la relation

$$\frac{1}{(1+x^2)^{n+1}} = \frac{1}{(1+x^2)^n} - \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}}$$

et une intégration par parties.

Autre méthode pour intégrer $\frac{1}{(1+x^2)^n}$

On utilise le changement de variables $x = \tan(u)$

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^n} dx &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^n} (1+\tan^2(u)) du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^{n-1}} du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \cos^{2n-2}(u) du .\end{aligned}$$

Autre méthode pour intégrer $\frac{1}{(1+x^2)^n}$

On utilise le changement de variables $x = \tan(u)$

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^n} dx &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^n} (1+\tan^2(u)) du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^{n-1}} du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \cos^{2n-2}(u) du .\end{aligned}$$

On est ainsi ramené au calcul d'une primitive de \cos^{2n-2} , et on calcule en linéarisant.

Autre méthode pour intégrer $\frac{1}{(1+x^2)^n}$

On utilise le changement de variables $x = \tan(u)$

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^n} dx &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^n} (1+\tan^2(u)) du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{1}{(1+\tan^2(u))^{n-1}} du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \cos^{2n-2}(u) du .\end{aligned}$$

On est ainsi ramené au calcul d'une primitive de \cos^{2n-2} , et on calcule en linéarisant.

Mais il faut savoir simplifier $\cos(\arctan(t))$ et $\sin(\arctan(t))$...

Un exemple

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{\arctan(t)} \cos^2(u) du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{\cos(2u) + 1}{2} du \\ &= \frac{\sin(2 \arctan(t))}{4} + \frac{\arctan(t)}{2} \\ &= \frac{\sin(\arctan(t)) \cos(\arctan(t)) + \arctan(t)}{2} .\end{aligned}$$

Un exemple

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{\arctan(t)} \cos^2(u) du \\ &= \int_0^{\arctan(t)} \frac{\cos(2u) + 1}{2} du \\ &= \frac{\sin(2 \arctan(t))}{4} + \frac{\arctan(t)}{2} \\ &= \frac{\sin(\arctan(t)) \cos(\arctan(t)) + \arctan(t)}{2} .\end{aligned}$$

Finalement, on arrive à

$$\int_0^t \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{\arctan(t)}{2}$$

Fractions rationnelles trigonométriques

Fonctions de la forme $F(t) = \frac{P(\sin(t), \cos(t))}{Q(\sin(t), \cos(t))}$ où P et Q sont des polynômes. On peut toujours se ramener à une intégrale de fraction rationnelle, via l'application des **règles de Bioche** :

- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = -t$ (autrement dit si F est impaire) alors on pose $u = \cos(t)$.

Fractions rationnelles trigonométriques

Fonctions de la forme $F(t) = \frac{P(\sin(t), \cos(t))}{Q(\sin(t), \cos(t))}$ où P et Q sont des polynômes. On peut toujours se ramener à une intégrale de fraction rationnelle, via l'application des **règles de Bioche** :

- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = -t$ (autrement dit si F est impaire) alors on pose $u = \cos(t)$.
- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = \pi - t$, alors on pose $u = \sin(t)$.

Fractions rationnelles trigonométriques

Fonctions de la forme $F(t) = \frac{P(\sin(t), \cos(t))}{Q(\sin(t), \cos(t))}$ où P et Q sont des polynômes. On peut toujours se ramener à une intégrale de fraction rationnelle, via l'application des **règles de Bioche** :

- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = -t$ (autrement dit si F est impaire) alors on pose $u = \cos(t)$.
- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = \pi - t$, alors on pose $u = \sin(t)$.
- Si $F(t)dt$ est laissé inchangé par le changement de variables $u = \pi + t$, alors on pose $u = \tan(t)$ (en se restreignant à un intervalle où ce changement de variables a un sens : il faut que \tan soit définie sur tout l'intervalle d'intégration !).

En désespoir de cause...

Si aucun des points précédents n'est vérifié, alors on pose

$$u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$$

En désespoir de cause...

Si aucun des points précédents n'est vérifié, alors on pose

$$u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$$

Bien sûr, il faut se placer sur un intervalle où le changement de variables a un sens, et se rendre compte que le calcul risque d'être long...

En désespoir de cause...

Si aucun des points précédents n'est vérifié, alors on pose

$$u = \tan\left(\frac{t}{2}\right)$$

Bien sûr, il faut se placer sur un intervalle où le changement de variables a un sens, et se rendre compte que le calcul risque d'être long... et on a besoin de savoir exprimer $\sin(t)$ et $\cos(t)$ en fonction de $\tan\left(\frac{t}{2}\right)$

Exemple d'application des règles de Bioche

On veut calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$.

Exemple d'application des règles de Bioche

On veut calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$.

Les règles de Bioche nous amènent au changement de variable $u = \cos(x)$, qui est \mathcal{C}^1 ; $du = -\sin(x)dx$ et $\sin^3(x)dx = \sin^2(x)\sin(x)dx = (1 - \cos^2(x))\sin(x)dx$.

Exemple d'application des règles de Bioche

On veut calculer $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3(x)}{1 + \cos^2(x)} dx$.

Les règles de Bioche nous amènent au changement de variable $u = \cos(x)$, qui est \mathcal{C}^1 ; $du = -\sin(x)dx$ et $\sin^3(x)dx = \sin^2(x)\sin(x)dx = (1 - \cos^2(x))\sin(x)dx$.

Donc

$$\begin{aligned} I &= \int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} -\frac{1-u^2}{1+u^2} du = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{1-u^2}{1+u^2} du \\ &= \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \left(-1 + \frac{2}{1+u^2} \right) du \\ &= -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \left[\arctan \right]_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2} - 2 \arctan \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right). \end{aligned}$$

Un dernier exemple pour le plaisir

On cherche une primitive de $f: x \mapsto \frac{1}{\cos^4(x) + \sin^4(x)}$.

Un dernier exemple pour le plaisir

On cherche une primitive de $f: x \mapsto \frac{1}{\cos^4(x) + \sin^4(x)}$.

On a $f(\pi + t) = f(t)$, donc le changement de variables $u = \tan(t)$ doit marcher ; supposons par exemple que $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Un dernier exemple pour le plaisir

On cherche une primitive de $f: x \mapsto \frac{1}{\cos^4(x) + \sin^4(x)}$.

On a $f(\pi + t) = f(t)$, donc le changement de variables $u = \tan(t)$ doit marcher ; supposons par exemple que $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

$$\begin{aligned}\frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} &= \frac{dt}{\cos^4(t)(1 + \tan^4(t))} \\ &= \frac{dt}{\cos^2(t)} \frac{1}{\cos^2(t)} \frac{1}{1 + \tan^4(t)} \\ &= \frac{dt}{\cos^2(t)} \frac{1 + \tan^2(t)}{1 + \tan^4(t)} \\ &= \frac{1 + u^2}{1 + u^4} du\end{aligned}$$

Suite de la recherche d'une primitive de $\frac{1}{\cos^4(t)+\sin^4(t)}$

$$\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} = \int_0^{\tan(x)} \frac{1+u^2}{1+u^4} du .$$

Suite de la recherche d'une primitive de $\frac{1}{\cos^4(t)+\sin^4(t)}$

$$\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} = \int_0^{\tan(x)} \frac{1 + u^2}{1 + u^4} du .$$

Maintenant on décompose en éléments simples :

Suite de la recherche d'une primitive de $\frac{1}{\cos^4(t)+\sin^4(t)}$

$$\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} = \int_0^{\tan(x)} \frac{1 + u^2}{1 + u^4} du .$$

Maintenant on décompose en éléments simples :

$$\begin{aligned} \frac{X^2 + 1}{X^4 + 1} &= \frac{X^2 + 1}{(X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)} \\ &= \frac{aX + b}{X^2 + \sqrt{2}X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} \end{aligned}$$

Suite de la recherche d'une primitive de $\frac{1}{\cos^4(t)+\sin^4(t)}$

$$\int_0^x \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} = \int_0^{\tan(x)} \frac{1 + u^2}{1 + u^4} du .$$

Maintenant on décompose en éléments simples :

$$\begin{aligned} \frac{X^2 + 1}{X^4 + 1} &= \frac{X^2 + 1}{(X^2 + \sqrt{2}X + 1)(X^2 - \sqrt{2}X + 1)} \\ &= \frac{aX + b}{X^2 + \sqrt{2}X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} \end{aligned}$$

Après calcul :

$$\frac{X^2 + 1}{X^4 + 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{X^2 + \sqrt{2}X + 1} + \frac{1}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} \right)$$

Et ça continue, encore et encore

On écrit :

$$\begin{aligned}\frac{1}{X^2 + \sqrt{2}X + 1} &= \frac{1}{\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{1 + (\sqrt{2}X + 1)^2}\end{aligned}$$

Et ça continue, encore et encore

On écrit :

$$\begin{aligned}\frac{1}{X^2 + \sqrt{2}X + 1} &= \frac{1}{\left(X + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{2}{1 + (\sqrt{2}X + 1)^2}\end{aligned}$$

Une primitive de $u \mapsto \frac{1}{u^2 + \sqrt{2}u + 1}$ est donc

$\sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}u + 1)$; une primitive de $u \mapsto \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1}$ est
 $-\sqrt{2} \arctan(-\sqrt{2}u + 1)$.

Tout ça pour ça

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} &= \int_0^{\tan(x)} \frac{1+u^2}{1+u^4} du \\ &= \int_0^{\tan(x)} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u^2 + \sqrt{2}u + 1} + \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}u + 1) - \sqrt{2} \arctan(-\sqrt{2}u + 1) \right]_0^{\tan(x)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\arctan(1 + \sqrt{2} \tan(x)) - \arctan(1 - \sqrt{2} \tan(x)) \right)\end{aligned}$$

Tout ça pour ça

$$\begin{aligned}\int_0^t \frac{dt}{\cos^4(t) + \sin^4(t)} &= \int_0^{\tan(x)} \frac{1+u^2}{1+u^4} du \\ &= \int_0^{\tan(x)} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u^2 + \sqrt{2}u + 1} + \frac{1}{u^2 - \sqrt{2}u + 1} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\sqrt{2} \arctan(\sqrt{2}u + 1) - \sqrt{2} \arctan(-\sqrt{2}u + 1) \right]_0^{\tan(x)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\arctan(1 + \sqrt{2} \tan(x)) - \arctan(1 - \sqrt{2} \tan(x)) \right)\end{aligned}$$

Ceci nous permet de déterminer une primitive de $\frac{1}{\cos^4(t) + \sin^4(t)}$
d'abord sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ puis sur \mathbb{R} tout entier, par π -périodicité.