

## ALGÈBRE 2 INFO, printemps 2026

### Fiche TD n°5 , ESPACES VECTORIELS

#### Pour commencer

##### Exercice 1.

- a) Rappeler les axiomes d'un espace vectoriel.  
b) On munit  $\mathbb{R}^2$  de l'addition habituelle :

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

et de la loi externe :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (\lambda, (x_1, x_2)) &\mapsto (\lambda x_1, 0). \end{aligned}$$

A-t-on muni ainsi  $\mathbb{R}^2$  d'une structure d'espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ ? (Justifier par rapport au point a)).

#### Des sous-espaces vectoriels

##### Exercice 2.

Dans les cas suivants, dessiner les sous-ensembles  $F$  de  $E = \mathbb{R}^2$  et indiquer si  $F$  est un sous-espace vectoriel de  $E$  :

- |  |   |
|--|---|
| a) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x + 3y = 0\}$ ,                 | f) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$ ,  |
| b) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2x + 3y = 1\}$ ,                 | g) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R} : x = 3\lambda, y = 2\lambda\}$ ,   |
| c) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$ ,                     | h) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \exists \lambda \in \mathbb{R}_+ : x = 3\lambda, y = 2\lambda\}$ , |
| d) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2\}$ ,                      | i) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ ,  |
| e) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 \text{ et } y = -x^2\}$ , | j) $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x^2 + 1 \text{ et } y = -x^2\}$ .                              |

##### Exercice 3.

Parmi les sous-ensembles de  $\mathbb{R}^n$  suivants, lesquels forment un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^n$ ? (Ci-dessous  $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$  et  $b \in \mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ ).

- |  |  |
|--|--|
| a) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$ ,                               | d) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot x = b\}$ , |
| b) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1\}$ ,                               |  |
| c) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0 \text{ et } \sum_{k=1}^n k^2 x_k = 0\}$ , | e) $\{x \in \mathbb{R}^n \mid A \cdot x = 0\}$ . |

##### Exercice 4.

Parmi les sous-ensembles des matrices suivants, lesquels forment un sous-espace vectoriel? (Ci-dessous,  $m, n \in \mathbb{N}^*$  et  $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$ ).

- a)  $\{A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \mid A_{11} = 0\}$ ,
- b)  $\{A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \mid A_{11} > 0\}$ ,
- c)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \sum_{i=1}^n A_{ii} = 0\}$ ,
- d)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^T = A\}$ ,
- e)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^2 = A\}$ ,
- f)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ inversible}\}$ ,
- g)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A \text{ pas inversible}\}$ ,
- h)  $\{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A \cdot B = B \cdot A\}$ .

**Exercice 5.**

On admet que  $E = \mathbb{R}[X]$ , des polynômes à coefficients réels, est un espace vectoriel. Parmi les sous-ensembles  $F$  ci-dessous, lesquels forment un sous-espace vectoriel ?

- a)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) = 3\}$ ,
- b)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) \leq 3\}$ ,
- c)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(3) = 0\}$ ,
- d)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 3\}$ ,
- e)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) + 3P'(0) = 0\}$ ,
- f)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(0) = 0 \text{ et } P'(0) = 0\}$ ,
- g)  $F = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P = \lambda X^3 + \mu^3 X - \lambda, \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$ .

**Exercice 6.**

Soit  $E$  l'espace vectoriel des suites de nombres réels. Parmi les sous-ensembles de  $E$  ci-dessous, lesquels forment des sous-espaces vectoriels ?

- a)  $F = \{(u_n) \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = u_{n+1} - u_n\}$ ,
- b)  $G = \{(u_n) \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_n - 1\}$ .

**Exercice 7.**

On note  $\mathbb{R}^{[a,b]}$  le  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel des applications de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{R}$ . Rappeler les définitions de l'addition et de la multiplication externe sur  $\mathbb{R}^{[a,b]}$  et dire lesquels de ces sous-ensembles sont des sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^{[a,b]}$  (ou de  $\mathbb{R}^{]a,b[}$  pour le e) :

- a)  $\mathcal{C}^n([a, b], \mathbb{R})$  pour  $n \in \mathbb{N} \cup \infty$ .
- b) Les applications surjectives (resp. injectives)  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .
- c) les applications  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $2f(a) = f(b)$ ,
- d) les applications  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $f(a) = f(b) + 1$ ,
- e) les applications  $f: ]a, b[ \rightarrow \mathbb{R}$  deux fois dérivables t.q.,  $\forall x \in ]a, b[, f''(x) + x^2 f(x) = 0$ .

**Exercice 8 (CC 2022).**

Les ensembles suivants sont des sous-ensembles d'espaces vectoriels, comme spécifiés par les conditions données. Lesquels d'entre eux sont des sous-espaces vectoriels ?

Répondre uniquement par **oui** ou **non**, sans preuve.

1.  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x \text{ ou } y = -x\}$
2.  $\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid \text{tr}(A) = 1\}$
3.  $\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid A \text{ commute avec } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$
4.  $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) < 2\}$
5.  $\{P \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) \leq 2\}$
6.  $\{f \in C^2(\mathbb{R}) \mid f''(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$

*Remarques sur la notation :*  $\text{tr}$  représente la trace de la matrice, deux matrices  $A$  et  $B$  commutent si  $A \cdot B = B \cdot A$ ,  $\deg$  est le degré du polynôme et  $f''$  la dérivée seconde de la fonction  $f$ .