

# Cours 4. Séries trigonométriques, séries de Fourier

Mathématiques 4

Printemps 2026

# 1. INTRODUCTION

Parmi ses contributions majeures, Joseph Fourier a introduit l'équation de la chaleur et a montré que les solutions de cette équation peuvent s'écrire comme sommes de séries trigonométriques bien choisies qui portent son nom depuis : les séries de Fourier.

Du point de vue des *applications*, les séries de Fourier sont un outil fondamental en traitement du signal ; elles peuvent aussi être considérées comme le premier pas vers la théorie moderne du traitement de l'information (FFT , ondelettes, JPEG, Hubble → "sparse data" ). Mais même du point de vue *théorique*, elles sont au cœur de pans entiers de mathématiques contemporaines, non seulement en analyse, mais aussi en théorie des nombres.

Considérons une barre homogène de longueur finie  $L$ . On s'intéresse à déterminer la température  $u(x, t)$  de la barre au point  $x$  et à l'instant  $t$ .

On impose que la température est toujours nulle<sup>1</sup> aux extrémités (*conditions de bord*) et qu'à l'instant  $t = 0$ , elle est donnée par une fonction  $\varphi : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$  (*condition initiale*).

L'équation qui régit la température  $u(x, t)$  en chaque point  $x$  à un instant  $t > 0$  est **l'équation de la chaleur**, ici en dimension 1 :

$$(E) \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t),$$

où  $D > 0$  est le coefficient de diffusion.

---

1. On suppose en fait qu'elle est toujours égale aux extrémités à une *constante*  $T_0$ , puis nulle, quitte à prendre  $T_0$  comme température de référence.

En cherchant des solutions particulières à variables séparées, i.e. de la forme  $u(x, t) = f(x)g(t)$ , on aboutit après calcul à des solutions de ( $E$ ) de la forme

$$u_n(x, t) = b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2}{L^2}Dt\right)$$

où  $n \in \mathbb{N}$  et  $b_n \in \mathbb{R}$ .

Ces solutions ont une forme commode à vérifier en injectant. Les entiers  $n \in \mathbb{N}$  apparaissent afin de satisfaire les conditions de bord.

L'équation ( $E$ ) est *linéaire* au sens où on a un certain "principe de superposition" : la somme ou un multiple de fonctions de la forme précédente reste encore solution de ( $E$ ). En passant aux sommes d'un **nombre infini**, donc aux **séries**, on peut chercher des solutions de la forme

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \exp\left(-\frac{\pi^2 n^2}{L^2}Dt\right),$$

avec       $\varphi(x) = u(x, 0) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right).$

Les **séries de Fourier** sont des séries de fonctions, qui servent à décomposer une **fonction périodique** comme "combinaison linéaire" de fonctions périodiques plus simples, de la forme  $\cos(n\omega x)$  ou  $\sin(n\omega x)$ , c'est à dire comme somme d'une série de la forme

$$\sum (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

## 2. SÉRIES TRIGONOMÉTRIQUES

## Définition 1

On appelle **série trigonométrique** toute série de fonctions de la forme

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)),$$

où  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\omega > 0$  et  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont des suites réelles ou complexes.

On dit que la série est **réelle** si  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont des suites réelles.

# Périodicité

## Rappel

Soit  $T \neq 0$ . Une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est dite **T-périodique** si pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(x + T) = f(x)$ . On dit alors que  $T$  est une période de  $f$ .

Le plus petit  $T > 0$  vérifiant la propriété précédente (s'il existe) est parfois appelé **la** période de  $f$ .

## Exemple

Pour  $\omega > 0$  fixé, la fonction  $x \mapsto \cos(n\omega x)$  est périodique de période  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ .

On a bien en effet

$$\cos(n\omega(x + 2\pi/\omega)) = \cos(n\omega x + 2n\pi) = \cos(n\omega x).$$

# Périodicité

Supposons que la série

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

converge simplement sur  $\mathbb{R}$  vers  $f$ , donc donnée par

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

Comme ces fonctions  $\sin(n\omega x)$  et  $\cos(n\omega x)$  sont  $\frac{2\pi}{\omega}$ -périodiques, la somme  $f$  est également  $\frac{2\pi}{\omega}$ -périodique. En effet, on a pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$\cos(n\omega(x + 2\pi/\omega)) = \cos(n\omega x), \quad \sin(n\omega(x + 2\pi/\omega)) = \sin(n\omega x)$$

et donc par passage à la limite que  $f(x + \frac{2\pi}{\omega}) = f(x)$ , et  $f$  est bien  $\frac{2\pi}{\omega}$ -périodique.

# Convergence

## Proposition 1

Si les séries numériques  $\sum a_n$  et  $\sum b_n$  sont **absolument convergentes** alors la série trigonométrique

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

est **normalement convergente** sur  $\mathbb{R}$ .

En effet, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ , l'*inégalité triangulaire* donne

$$|a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)| \leq |a_n| + |b_n|.$$

# Écriture complexe

Considérons une série trigonométrique réelle

$$(1) \quad \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

En utilisant les formules d'Euler

$$\cos(n\omega x) = \frac{e^{in\omega x} + e^{-in\omega x}}{2}, \quad \sin(n\omega x) = \frac{e^{in\omega x} - e^{-in\omega x}}{2i}$$

la série (1) s'écrit

# Écriture complexe

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} \left( a_n \frac{e^{in\omega x} + e^{-in\omega x}}{2} + b_n \frac{e^{in\omega x} - e^{-in\omega x}}{2i} \right)$$

ou encore

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} \left( e^{in\omega x} \frac{a_n - ib_n}{2} + e^{-in\omega x} \frac{a_n + ib_n}{2} \right).$$

Posons donc

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} \text{ et } c_{-n} = \bar{c}_n = \frac{a_n + ib_n}{2}.$$

# Écriture complexe

Alors la série (1) devient

$$\begin{aligned} & c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n e^{in\omega x} + c_{-n} e^{-in\omega x}) \\ & = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\omega x} + \sum_{n=1}^{\infty} c_{-n} e^{-in\omega x} \\ & = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{in\omega x} + \sum_{-\infty}^{-1} c_n e^{in\omega x} \\ & = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in\omega x}. \end{aligned}$$

La dernière expression est appelée la **forme complexe** de la série trigonométrique (1).

## Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$

Considérons une série trigonométrique réelle

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

convergeant *uniformément* sur  $\mathbb{R}$  vers la fonction  $f$  donnée par

$$(1) \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

On souhaite calculer/identifier les coefficients  $a_n$  et  $b_n$  en fonction de  $f$ , (un peu) comme dans le cas des fonctions développables en séries entières. Ceci donnerait en particulier l'**unicité** d'une telle décomposition de  $f$ .

Soit  $p \in \mathbb{N}$ , fixé. En multipliant les deux côtés de l'égalité (1) par  $\cos(p\omega x)$ , on a

$$f(x) \cos(p\omega x) = \frac{a_0}{2} \cos(p\omega x) + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega x) \cos(p\omega x) + b_n \sin(n\omega x) \cos(p\omega x)$$

. On multiplie aussi les deux côtés de l'égalité (1) par  $\sin(p\omega x)$  pour écrire

$$f(x) \sin(p\omega x) = \frac{a_0}{2} \sin(p\omega x) + \sum_{n \geq 1} a_n \cos(n\omega x) \sin(p\omega x) + b_n \sin(n\omega x) \sin(p\omega x)$$

## Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$

Comme la série converge uniformément, on peut intégrer terme à terme

$$\int_0^{2\pi/\omega} f(x) \cos(p\omega x) dx =$$

$$\int_0^{2\pi/\omega} \frac{a_0}{2} \cos(p\omega x) dx$$

$$+ \sum_{n \geq 1} a_n \int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \cos(p\omega x) dx + b_n \int_0^{2\pi/\omega} \sin(n\omega x) \cos(p\omega x) dx.$$

## Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \sin(p\omega x) \, dx = \\ & \int_0^{2\pi/\omega} \frac{a_0}{2} \sin(p\omega x) \, dx \\ & + \sum_{n \geq 1} a_n \int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \sin(p\omega x) \, dx + b_n \int_0^{2\pi/\omega} \sin(n\omega x) \sin(p\omega x) \, dx. \end{aligned}$$

Il reste donc à calculer pour tout  $n \in \mathbb{N}$  les quantités

$$\int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \cos(p\omega x) dx, \quad \int_0^{2\pi/\omega} \sin(n\omega x) \sin(p\omega x) dx$$

$$\int_0^{2\pi/\omega} \sin(n\omega x) \cos(p\omega x) dx \quad \int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \sin(p\omega x) dx.$$

# Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$

## Exercice

Montrer que

$$\int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \cos(p\omega x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } p \neq n \\ \pi/\omega & \text{si } p = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi/\omega} \sin(n\omega x) \sin(p\omega x) dx = \begin{cases} 0 & \text{si } p \neq n \\ \pi/\omega & \text{si } p = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi/\omega} \cos(n\omega x) \sin(p\omega x) dx = 0.$$

## Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$

Après substitution, on obtient donc

$$a_p = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \cos(p\omega x) \, dx,$$

$$b_p = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \sin(p\omega x) \, dx.$$

## Calcul des coefficients $a_n$ , $b_n$ : conclusion

Considérons toujours une série trigonométrique réelle

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$$

convergeant uniformément sur  $\mathbb{R}$  vers sa somme  $f$  donnée par

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}$

$$a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \cos(n\omega x) \, dx,$$

$$b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \sin(n\omega x) \, dx.$$

## En écriture complexe

On obtient de façon similaire

$$c_n = \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) e^{-inx} dx, \text{ pour tout } n \in \mathbb{Z}.$$

### 3. SÉRIES DE FOURIER

# Séries de Fourier

## Définition (Séries de Fourier)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique où on pose  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ , intégrable sur tout intervalle fermé et borné. On appelle **série de Fourier** associée à  $f$ , la série trigonométrique

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)),$$

où

$$a_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \cos(n\omega x) \, dx,$$

$$b_n = \frac{\omega}{\pi} \int_0^{2\pi/\omega} f(x) \sin(n\omega x) \, dx,$$

(appelés **coefficients de Fourier**).

# Séries de Fourier

On peut écrire les coefficients en fonction de la période  $T$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos \left( n \frac{2\pi}{T} x \right) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin \left( n \frac{2\pi}{T} x \right) dx.$$

# Séries de Fourier : exemple

## Exemple

Considérons la fonction  $2\pi$ -périodique suivante, appelée la fonction **créneau** :

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pour } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{pour } x \in ]\pi, 2\pi[. \end{cases}$$



## Séries de Fourier : exemple

Calculons les coefficients de Fourier  $a_n$  et  $b_n$  de  $f$ .

$$a_0 = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 1 dx = 1;$$

pour  $n \geq 1$ ,

$$a_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{\sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = 0;$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[ \frac{-\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1 - (-1)^n}{\pi n}. \end{aligned}$$

## Séries de Fourier : exemple

D'où on obtient la série de Fourier

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1 - (-1)^n)}{\pi n} \sin(nx)$$

et comme  $(1 - (-1)^n) = 0$  si  $n$  est pair et  $(1 - (-1)^n) = 2$  si  $n$  est impair,  
on peut écrire la série sous la forme


$$\frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x).$$

# Séries de Fourier : exemple

Si on calcule la somme partielle pour des valeurs de  $n$  de plus en plus grande

$$S_n(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{(1 - (-1)^k)}{\pi k} \sin(kx)$$

on constate une *convergence* vers la fonction  $f$ , comme le montre le dessin suivant :



# Séries de Fourier : convergence

Donc, d'une façon général, étant donnée une fonction  $f$  et sa série de Fourier, on peut se demander :

- **La série de Fourier** associée à  $f$  **est-elle convergente** en un certain sens ?
- En cas d'une telle convergence, peut-on aussi dire que la série converge **vers**  $f$  ?

# Séries de Fourier : convergence

## Notation

Si la série de Fourier associée à  $f$  converge simplement, on note sa somme  $Sf$  :

$$Sf(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)).$$

## Attention

Il existe des fonctions, même continues (périodiques), dont la série de Fourier diverge au moins en un point  $x$ , de sorte que l'égalité  $Sf(x) = f(x)$  n'a même pas de sens.

## Culture

Cependant, un résultat dû à Fejér (allant au delà des ambitions de ce cours) dit cependant que si  $f$  est continue et que sa série de Fourier converge en  $x$ , alors on a  $Sf(x) = f(x)$ .

# Séries de Fourier : convergence

## Définition 3

Une fonction  $f$  admet **une discontinuité de première espèce** en un point  $x_0$  si les limites à droite et à gauche en  $x_0$  existent et sont finies.

## Définition 4

Une fonction  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est **continue par morceaux** sur  $[a, b]$  s'il existe une subdivision  $a_0 = a < a_1 < a_2 < \dots < a_n = b$  telle que  $f$  est continue sur chaque intervalle  $]a_i, a_{i+1}[$  avec des limites finies en  $a_i^+$  et  $a_{i+1}^-$ .

## Exemple



## Remarque

Une fonction  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  est **continue par morceaux** sur  $[a, b]$  si et seulement si elle n'a qu'un nombre fini de points de discontinuité sur  $[a, b]$  et elles sont toutes de première espèce.

## Notation

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue par morceaux et  $x \in \mathbb{R}$ . On note

$$f(x^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x + h); \quad f(x^-) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(x - h).$$

## Définition

Soit  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  une application. On dit que  $f$  est **de classe  $C^1$  par morceaux** s'il existe une subdivision  $a = a_0 < a_1 < \cdots < a_n = b$  telle que pour tout  $i \in \{0, \dots, n - 1\}$ ,  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $]a_i, a_{i+1}[$  et  $f$  et  $f'$  possèdent des limites finies à gauche et à droite en  $a_i$  et  $a_{i+1}$ .

## Théorème de Jordan-Dirichlet (Convergence normale)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique. Supposons que  $f$  est de classe  $C^1$  par morceaux sur tout intervalle fermé et borné  $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ . Alors pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , la série de Fourier associée à  $f$  converge et on a

$$Sf(x) = \frac{1}{2}(f(x^-) + f(x^+)).$$

En particulier, en tout point  $x$  où  $f$  est continue, la somme de la série de Fourier de  $f$  est  $f(x)$ .

Enfin la convergence est normale (et donc uniforme) sur tout intervalle fermé et borné où la fonction  $f$  est continue. Si de plus  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , on a même

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (|a_n| + |b_n|) \text{ converge.}$$

L'ENSEMBLE DES FONCTIONS ETUDIEES EN COURS ET EN TD SERONT  $C^1$  PAR MORCEAUX.

## Exemple

Reprendons la fonction créneau

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pour } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{pour } x \in ]\pi, 2\pi[, \end{cases}$$

dont nous avons calculé la série de Fourier

$$\frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x).$$

On peut donc écrire

$$Sf(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x).$$

On voit que  $f$  est continue par morceaux sur tout intervalle  $[a, b]$  (comme  $f$  est  $2\pi$ -periodique, il suffit de le vérifier sur une période  $[0, 2\pi]$ ) et qu'elle est aussi de classe  $C^1$  par morceaux (exercice). Par conséquent, on a pour tout  $x \in \mathbb{R} \setminus \{m\pi \mid m \in \mathbb{Z}\}$ ,

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x)$$

et pour  $x = m\pi$ ,  $m \in \mathbb{Z}$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2}{\pi(2k+1)} \sin((2k+1)x).$$

# Périodicité et intégrales

## Propriété

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique. Alors pour tout  $a \in \mathbb{R}$ , on a

$$\int_0^T f(x) dx = \int_a^{a+T} f(x) dx.$$

## Preuve

On a

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^0 f(x) dx + \int_0^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx$$

Or en utilisant le changement de variable  $t = x - T$ , on a

$$\int_T^{a+T} f(x) dx = \int_0^a f(t + T) dt = \int_0^a f(x) dx, \text{ d'où le résultat.}$$

# Périodicité et intégrales

Donc pour le calcul des coefficients de Fourier, on a

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = \frac{2}{T} \int_a^{a+T} f(x) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx = \frac{2}{T} \int_a^{a+T} f(x) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} x\right) dx,$$

et pour les fonctions  $2\pi$ -périodiques, en prenant  $a = -\pi$ ,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

# Parité et intégrales

## Rappel

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. On dit que

- $f$  est paire si  $f(-x) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,
- $f$  est impaire si  $f(-x) = -f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

## Propriété

Soit  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction Riemann-intégrable.

- Si  $g$  est paire alors

$$\int_{-a}^a g(x) \, dx = 2 \int_0^a g(x) \, dx.$$

- Si  $g$  est impaire alors

$$\int_{-a}^a g(x) \, dx = 0.$$

# Parité et intégrales

## Conséquence

- Si  $f$  est paire alors

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx,$$

$$b_n = 0, \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

- Si  $f$  est impaire alors

$$a_n = 0, \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N},$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

## Exemples

(1) Soit  $0 < \alpha < \pi$ . On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  périodique de période  $2\pi$  définie par

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } -\alpha \leq x \leq \alpha; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Calculons les coefficients de Fourier de la fonction  $f$ .

Vérifions que  $f$  est paire. Si  $|x| \leq \alpha$ , alors  $f(-x) = f(x) = 1$  et si  $|x| > \alpha$ , alors  $f(-x) = f(x) = 0$ .

Comme  $f$  est paire,  $b_n = 0$  et donc on calcule  $a_0$  et  $a_n$ .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} 1 dx = \frac{2\alpha}{\pi}.$$

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\alpha} \cos(nx) dx = \frac{2 \sin(n\alpha)}{\pi n}.
 \end{aligned}$$

Calculons la somme  $Sf$  de la série de Fourier. La fonction  $f$  a deux points de discontinuité sur  $[-\pi, \pi]$  :  $-\alpha, \alpha$ . Comme  $f$  est  $C^1$  par morceaux et que  $f$  est continue sur  $[-\pi, \pi] \setminus \{-\alpha, \alpha\}$ , on a d'après le théorème de Jordan-Dirichlet que, pour tout  $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{-\alpha, \alpha\}$ ,

$$f(x) = Sf(x) = \frac{\alpha}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 \sin(n\alpha)}{\pi n} \cos(nx) \quad \text{et que}$$

$$Sf(-\alpha) = \frac{f((-\alpha)^+) + f((-\alpha)^-)}{2} = \frac{1}{2}, \quad Sf(\alpha) = \frac{f(\alpha^+) + f(\alpha^-)}{2} = \frac{1}{2}.$$

(2) On considère la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique définie par

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = |x|.$$

Calculons les coefficients de Fourier de la fonction  $f$ . Comme  $f$  est paire,  $b_n = 0$  et donc on calcule  $a_0$  et  $a_n$ .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ est pair;} \\ \frac{-4}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$$

Calculons la somme  $Sf$  de la série de Fourier. Comme  $f$  est  $C^1$  par morceaux, et comme  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ , d'après le théorème de Jordan-Dirichlet,

$$f(x) = Sf(x) = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4}{\pi(2n+1)^2} \cos((2n+1)x), \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

**Application.** En prenant  $x = 0$ , on obtient

$$0 = f(0) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$$

et donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

# Applications définies sur un intervalle fermé et borné

## Propriété

Soit  $f : [a, a + 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$  une application continue par morceaux telle que  $f(a) = f(a + 2\pi)$ . Alors il existe une unique fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique et continue par morceaux qui coïncide avec  $f$  sur  $[a, a + 2\pi]$ .

## Preuve

On translate le graphe de  $f$  sur les intervalles de la forme  $[a + 2k\pi, a + 2(k + 1)\pi]$  qui recouvrent  $\mathbb{R}$ . On a

$$\mathbb{R} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [a + 2k\pi, a + 2(k + 1)\pi], \text{ et on définit } g \text{ sur } [a + 2k\pi, a + 2(k + 1)\pi]$$

$$\text{par } g(x) = f(x - 2k\pi)$$

On vérifie bien que  $g$  est  $2\pi$ -périodique et coïncide sur  $[a, a + 2\pi]$  avec  $f$ . □

# Applications définies sur un intervalle fermé et borné

## Exemple 3

Développons en série de Fourier la fonction  $e^x$  sur l'intervalle  $]0, \pi[$ . On définit

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \in ]0, \pi[ \\ e^{-x} & \text{si } x \in ]-\pi, 0]. \end{cases}$$

Alors  $f$  vérifie les conditions de la propriété précédente et donc il existe une fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique qui coïncide avec  $f$  sur  $]-\pi, \pi[$ . La fonction  $g$  est paire et donc on calcule  $a_0$  et (en intégrant par parties deux fois avec à chaque fois une dérivation sur  $e^x$ )  $a_n$ .

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x dx = \frac{2(e^\pi - 1)}{\pi}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^x \cos(nx) dx = 2 \frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1 + n^2}.$$

# Applications définies sur un intervalle fermé et borné

Donc pour tout  $x \in ]0, \pi[$ , on a

$$e^x = \frac{e^\pi - 1}{\pi} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \frac{(-1)^n e^\pi - 1}{1 + n^2} \cos(nx).$$

Remarque. Il est utile de connaître la propriété suivante, conséquence directe de la définition des  $a_n$ ,  $b_n$  et d'une **intégration par parties** :

## Proposition

Si  $f$  est continue,  $L$ -périodique (avec toujours  $L = \frac{2\pi}{\omega}$ ) et  $C^1$  par morceaux, alors pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$a_n(f') = n\omega b_n(f), \quad b_n(f') = -n\omega a_n(f).$$

# Relations de Bessel-Parseval

## Théorème 1 (Bessel-Parseval)

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction  $T$ -périodique  $C^1$  par morceaux, avec  $T = \frac{2\pi}{\omega} > 0$ . Alors,  $\sum_{n \geq 0} |c_n|^2$ ,  $\sum_{n \geq 1} (a_n^2 + b_n^2)$  sont convergentes et on a

(Égalité de Parseval)

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{T} \int_0^T f(x)^2 dx,$$

où les  $a_n, b_n$  sont les coefficients de la série de Fourier associée à  $f$  et les  $c_n$  sont les coefficients en écriture complexe.

# Relations de Bessel-Parseval

## Remarque

Donc si  $f$  est  $2\pi$ -périodique (et continue par morceaux ou plus généralement Riemann intégrable), on a

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)^2 dx.$$

L'une des beautés de cette identité est qu'elle a lieu même si la série de Fourier diverge ou a une somme différente de  $f$  en certains points !

# Relations de Bessel-Parseval

## Exemple 1 (suite)

Reprendons la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , périodique de période  $2\pi$ , définie par

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } -\alpha \leq x \leq \alpha; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

où  $0 < \alpha < \pi$ . On a  $a_0 = \frac{2\alpha}{\pi}$ ,  $a_n = \frac{2 \sin(n\alpha)}{\pi n}$ . En appliquant la formule de Parseval, on obtient :

$$\frac{\alpha^2}{\pi^2} + \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} \frac{4 \sin^2(n\alpha)}{\pi^2 n^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{\alpha}{\pi},$$

puis

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\sin^2(n\alpha)}{n^2} = \frac{\pi^2}{2} \left( \frac{\alpha}{\pi} - \frac{\alpha^2}{\pi^2} \right) = \frac{\alpha\pi - \alpha^2}{2}.$$

# Relations de Bessel-Parseval

## Exemple 2 (suite)

Reprendons la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $2\pi$ -périodique définie par

$$\forall x \in [-\pi, \pi], f(x) = |x|.$$

On a  $a_0 = \pi$ ,  $a_n = \begin{cases} 0, & \text{si } n \text{ est pair;} \\ \frac{-4}{\pi n^2}, & \text{si } n \text{ est impair.} \end{cases}$

En appliquant l'égalité de Parseval, on a

$$\frac{\pi^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{16}{\pi^2(2n+1)^4} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}$$

et donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}.$$

MERCI DE VOTRE ATTENTION !