
Feuille d'exercices n° 9 : Fonctions implicites, courbes et surfaces

Exercice 1. On considère l'ensemble \mathcal{C} des points (x, y) du plan vérifiant $x^3 - 2xy + 2y^2 = 1$.

- Montrer que les points de \mathcal{C} au voisinage du point $(1, 1)$ sont de la forme $(x, \varphi(x))$, où φ est une fonction régulière au voisinage de 1. Déterminer la tangente au graphe de φ au point $(1, 1)$ et préciser la position de la courbe par rapport à cette tangente au voisinage de ce point.
- Trouver tous les points de \mathcal{C} au voisinage desquels le théorème des fonctions implicites ne s'applique ni pour exprimer x en fonction de y ni pour exprimer y en fonction de x .

Exercice 2 (Stabilité des points réguliers et des points critiques de Morse). Soient Λ un espace vectoriel de dimension finie et une fonction $f : \Lambda \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^∞ . Pour tout $\lambda \in \Lambda$ on notera $f_\lambda : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f_\lambda(x) = f(\lambda, x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$.

- On suppose ici que 0 n'est pas un point critique de f_0 (on dit qu'il est *régulier*). Montrer que, pour λ suffisamment proche de 0, f_λ n'a pas de point critique proche de 0.
- Rappel (ou pas) : on appelle *point critique de Morse* d'une fonction régulière un point critique de cette fonction où sa Hessienne est non dégénérée. On dit aussi qu'un tel point critique est non-dégénéré. On suppose maintenant que 0 est un point critique de Morse de f_0 . Montrer que, pour λ suffisamment proche de 0, f_λ a un unique point critique au voisinage de 0. Si on le note $a(\lambda)$, montrer que c'est un point critique de Morse et que la fonction $\lambda \mapsto a(\lambda)$ est de classe \mathcal{C}^∞ .
- Peut-on généraliser ce résultat aux points critiques dégénérés de f_0 ? À ceux qui sont isolés?

Exercice 3 (Lemme de Morse en dimension 2). Soit U un ouvert convexe de \mathbb{R}^2 contenant 0 et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^∞ . On suppose que 0 est un point critique de Morse de f , c'est-à-dire que $d_0 f = 0$ et $d_0^2 f$ est une forme bilinéaire non dégénérée.

- Montrer qu'il existe des fonctions $\alpha, \beta, \gamma : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 telles que

$$\forall (x, y) \in U, \quad f(x, y) = f(0, 0) + \alpha(x, y)x^2 + 2\beta(x, y)xy + \gamma(x, y)y^2.$$

- On suppose ici que la forme quadratique associée à $d_0^2 f$ est de signature $(+-)$. Montrer qu'il existe un voisinage $V \subset U$ de $(0, 0)$ et des fonctions $u, v : V \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^1 telles que

$$\forall (x, y) \in V, \quad f(x, y) = f(0, 0) + u(x, y)^2 - v(x, y)^2,$$

et l'application $\varphi : (x, y) \mapsto (u(x, y), v(x, y))$ est un difféomorphisme de V sur son image.

- Comment adapter ce résultat aux cas des signatures $(++)$ et $(--)$?

Exercice 4 (Courbes de niveau). Soit U un ouvert de \mathbb{R}^2 et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^∞ .

Rappel (ou pas) : on appelle *courbe de niveau* de f un ensemble de la forme $\{(x, y) \in U; f(x, y) = c\}$, où c une constante arbitraire.

- Soit (x_0, y_0) un point régulier de f . Montrer que l'ensemble $\{(x, y) \in U; f(x, y) = f(x_0, y_0)\}$ est une courbe au voisinage de (x_0, y_0) que l'on peut paramétrer soit par x soit par y .
- En utilisant l'exercice précédent, que peut-on dire des courbes de niveau de f au voisinage d'un point critique de Morse?

- c) On considère ici la fonction $f : (x, y) \mapsto \frac{1}{2}y^2 - \cos x$. Calculer ses points critiques et étudier ses courbes de niveau.

Exercice 5 (Rang constant). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'espace des matrices carrées $n \times n$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ le groupe des matrices inversibles.

- a) Rappeler pourquoi $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est un ouvert et calculer la différentielle de l'application φ définie sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ par $\varphi(M) = M^{-1}$.
- b) On fixe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et on considère l'application ψ définie sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ par $\psi(M) = MAM^{-1}$. Montrer que ψ est différentiable, calculer sa différentielle et montrer ψ est de rang constant (c'est-à-dire que sa différentielle $D_M\psi$ est de rang indépendant de M).