

---

**Feuille d'exercices d'analyse n° 2**  
**APPLICATIONS ET QUANTIFICATEURS**

---

## Objectifs

1. Définition d'une application, comprendre l'importance de l'ensemble de départ, de l'ensemble d'arrivée ;
2. savoir utiliser les quantificateurs, comprendre l'importance de l'ordre des quantificateurs, savoir les appliquer aux applications ;
3. définition de l'injectivité, surjectivité et bijectivité, exemples et contre-exemple, lien avec l'image directe.

## Applications

### Définition d'une application

**Exercice 1.** Décider si les formules suivantes définissent des applications. Dans le cas contraire, corriger si possible.

1.  $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}, x \mapsto x ;$
2.  $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}, x \mapsto x ;$
3.  $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \{1, 2, 3\}, x \mapsto x ;$
4.  $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2\}, x \mapsto x ;$
5.  $f : \{\text{bleu, rouge, jaune}\} \rightarrow \{\text{bleu, jaune, rouge}\}, x \mapsto x ;$
6.  $f(1) = 1, f(2) = 2, f(3) = 3 ;$
7.  $f^{-1}(\{1\}) = \{3\}, f^{-1}(\{2\}) = \{1\}, f^{-1}(\{3\}) = \{2\} ;$
8.  $f^{-1}(\{1\}) = \{1, 2\}, f^{-1}(\{2\}) = \{1\}, f^{-1}(\{3\}) = \{3\}.$

**Exercice 2.** Décider si les paires de fonctions qui suivent sont égales :

1.  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto (x^2 + 2x + 1)(x - 1)$  et  $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto (x + 1)(x^2 - 1) ;$
2.  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \sin(x)$  et  $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \exp(x) ;$
3.  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \sin(x)$  et  $g : \mathbf{R} \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin(x) ;$
4.  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x + 1$  et  $g : \mathbf{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto \frac{x^2 - 1}{x - 1} ;$
5.  $f : \{x \in \mathbf{R} \mid |x - 2| < \frac{1}{2}|x + 3|\} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto 0$  et  $g : ]\frac{1}{3}, 7[ \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto 0 ;$
6.  $f : \mathbf{R}_+ \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto (\sqrt{x})^2$  et  $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}, x \mapsto x.$

## Quantificateurs et applications

**Exercice 3.** Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbf{R}$ , et  $f : I \rightarrow \mathbf{R}$  une application définie sur  $I$  et à valeurs réelles. Exprimer à l'aide de quantificateurs :

1. la fonction  $f$  s'annule ;
2. la fonction  $f$  est toujours nulle ;
3.  $f$  n'est pas une fonction constante ;
4.  $f$  est croissante ;
5.  $f$  est décroissante ;
6.  $f$  présente un minimum ;
7.  $f$  présente un maximum.

**Exercice 4.** Donner la négation des assertions de l'exercice précédent.

## Image directe, image réciproque d'une application

**Exercice 5.** Soit  $f$  l'application de l'ensemble  $\{1, 2, 3, 4\}$  dans lui-même définie par  $f(1) = 4$ ,  $f(2) = 1$ ,  $f(3) = 2$ ,  $f(4) = 2$ . Déterminer  $f^{-1}(A)$  lorsque  $A = \{2\}$ ,  $A = \{1, 2\}$ ,  $A = \{3\}$ .

**Exercice 6.** Décrire les ensembles qui suivent.

1.  $\tan(\{0\})$  ;
2.  $\sin^{-1}(\{2\})$  ;
3.  $\cos^{-1}([0, 1])$  ;
4.  $(\cos|_{[3, 7]})^{-1}([0, 1])$  ;
5.  $(\cos|_{[0, \pi]})^{-1}([0, 1])$  ;
6.  $\sqrt{\cdot}([0, 1])$  ;
7.  $f^{-1}([0, 1])$  pour  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto x^2$  ;
8.  $f^{-1}([0, 1])$  pour  $f : [-\frac{1}{2}, \frac{4}{3}] \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto x^2$  ;
9.  $f^{-1}([0, 1])$  pour  $f : \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto x^2$  ;
10.  $f^{-1}([-1, 1] \cup \{2\})$  et  $f([0, 1]^3)$   
pour  $f : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $(x, y, z) \mapsto y$  ;
11.  $|\cdot|([-2, -1] \cup [2, 4])$  ;
12.  $(|\cdot|_{[-8, 7]})^{-1}([2, 3])$  ;
13.  $|\cdot|^{-1}(\{1\})$  ;
14.  $\exp([\infty, 2])$  ;
15.  $\exp^{-1}([-1, e])$  ;
16.  $\ln(\mathbf{R}_-)$  ;
17.  $\ln^{-1}([3, +\infty])$ .

**Exercice 7.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles non vides et  $f : E \rightarrow F$ .

1. Soit  $I$  un ensemble et  $(A_i)_{i \in I} \in \mathcal{P}(E)^I$ . Montrer que

$$f \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} f(A_i) \quad \text{et} \quad f \left( \bigcap_{i \in I} A_i \right) \subset \bigcap_{i \in I} f(A_i) .$$

2. Pour l'inclusion de la question précédente, donner un contre-exemple à l'inclusion réciproque.

3. Soit  $I$  un ensemble et  $(B_i)_{i \in I} \in \mathcal{P}(F)^I$ . Montrer que

$$f^{-1} \left( \bigcup_{i \in I} B_i \right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \quad \text{et} \quad f^{-1} \left( \bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i) .$$

## Injectivité, surjectivité, bijectivité

**Exercice 8.** Étudier l'injectivité et la surjectivité des applications qui suivent. Lorsqu'elles sont bijectives, donner leur inverse.

1.  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto \cos(x)$ ;
2.  $[\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$ ,  $x \mapsto \sin(x)$ ;
3.  $\mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ ,  $(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$ ;
4.  $\mathbf{N} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto x$ ;
5.  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto \begin{cases} -\ln x & \text{si } x > 0 \\ x^2 & \text{sinon} \end{cases}$ ;
6.  $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x < 0 \\ x^2 & \text{sinon} \end{cases}$ ;
7.  $\{0, 1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 7, 9, 11\}$ ,  $x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 11 & \text{si } x = 1 \\ 7 & \text{si } x = 2 \\ 9 & \text{si } x = 3 \end{cases}$ ;
8.  $\{0, 1, 2\} \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ ,  $x \mapsto -(x - 1)$ ;
9.  $\mathcal{F}(\mathbf{R}, \mathbf{R}) \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f \mapsto f(0)$ .

## Exercice 9.

1. On considère l'application  $f : I \rightarrow J$ ,  $x \mapsto x^2$ , où  $I$  et  $J$  sont deux intervalles de  $\mathbf{R}$ . Trouver  $I$  et  $J$  tels que :
  - (a)  $f$  est injective mais pas surjective;
  - (b)  $f$  est surjective mais pas injective;
  - (c)  $f$  est bijective.
2. Peut-on simplifier les exemples de la question précédente en considérant d'autres ensembles plus simples que des intervalles ?

**Exercice 10.** Soit  $E$ ,  $F$  deux ensembles finis de même cardinal, et  $f : E \rightarrow F$  une application de  $E$  dans  $F$ . Montrer que  $f$  est bijective si et seulement si  $f$  est surjective.

**Exercice 11.** Soit  $E$ ,  $F$  et  $G$  trois ensembles non vides. Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{F}(F, G)$ .

1. On suppose  $g \circ f$  injective. Montrer que  $f$  est injective et que  $g$  l'est aussi si  $f$  est surjective.
2. On suppose  $g \circ f$  surjective. Montrer que  $g$  est surjective et que  $f$  l'est aussi si  $g$  est injective.

**Exercice 12.** Soit  $E$  un ensemble non vide et  $f : E \rightarrow \mathcal{P}(E)$ .

Étudier la surjectivité de  $f$  en considérant  $A = \{x \in E \mid x \notin f(x)\}$ .

**Exercice 13.** Soient  $E$  et  $F$  deux ensembles non vides et  $f : E \rightarrow F$ .

1. Prennons un exemple :  $E = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ ,  $F = \{w, x, y, z\}$  et  $f : E \rightarrow F$  définie comme suit :  $f(\alpha) = x$ ,  $f(\beta) = y$ ,  $f(\gamma) = x$ ,  $f(\delta) = w$ .
  - (a) Est-ce que  $f$  est injective, surjective ou ni l'un ni l'autre ?
  - (b) Soit  $B = \{x, y, z\}$ . Déterminer  $f^{-1}(B)$  puis  $f(f^{-1}(B))$  et comparer avec  $B$ .
  - (c) Soit  $A = \{\beta, \gamma\}$ . Déterminer  $f(A)$  puis  $f^{-1}(f(A))$  et comparer avec  $A$ .

2. Soit  $B \subset F$ .
  - (a) Montrer que  $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$ .
  - (b) À quelle condition a-t-on  $f(f^{-1}(B)) = B$  ?
3. Montrer que  $f$  est surjective si et seulement si, pour tout  $B \in \mathcal{P}(F)$ ,  $f(f^{-1}(B)) = B$ .
4. Soit  $A \subset E$ .
  - (a) Montrer que  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .
  - (b) Que peut-on dire si  $f|_{f^{-1}(f(A))}$  est injective ?
5. Montrer que  $f$  est injective si et seulement si, pour tout  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,  $f^{-1}(f(A)) = A$ .

**Exercice 14.** Soit  $E$  et  $F$  deux ensembles non vides et  $f : E \rightarrow F$ .

1. Montrer que, pour tout  $B \subset F$ ,  $f(f^{-1}(B)) = B \cap f(E)$ .
2. En déduire que si  $f$  est surjective alors, pour tout  $B \in \mathcal{P}(F)$ ,  $f(f^{-1}(B)) = B$ .
3. Montrer que, pour tout  $A \subset E$ ,  $A \subset f^{-1}(f(A))$ .
4. Montrer que si  $f$  est injective alors, pour tout  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,  $f^{-1}(f(A)) = A$ .