
Feuille 3
Espaces engendrés ; bases ; dimension ; supplémentaires

Exercice 3.1(*)

Déterminer une base échelonnée du sous-espace vectoriel F de \mathbf{R}^4 engendré par

$$(1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4), (3, 1, 4, 2), (10, 4, 13, 7), (1, 7, 8, 14) .$$

Donner la dimension de F ; le cas échéant, compléter la base de F obtenue ci-dessus en base de \mathbf{R}^4 .

Exercice 3.2 Soit $u = (1, 2, 3, 4)$ et $v = (1, -2, 3, -4)$.

1. Donner un système de 2 équations à 4 inconnues dont l'ensemble des solutions soit égal à $\text{Vect}(u, v)$.
2. Peut-on trouver $(x, y) \in \mathbf{R}^2$ pour que $(x, 1, y, 1) \in \text{Vect}(u, v)$? Pour que $(x, 1, 1, y) \in \text{Vect}(u, v)$?

Exercice 3.3(*) Dans \mathbf{R}^3 , déterminer la nature géométrique et une base des sous-espaces vectoriels suivants :

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 2x + y + z = 0\}$.
2. $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 2y - z = 0\}$.
3. $E_3 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : 2x + y + z = 0 \text{ et } 2y - z = 0\}$.
4. $F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x + 2y + z = 0\}$.
5. $F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbf{R}^3 : x + y = 0 \text{ et } y + z = 0\}$.
6. $F_3 = F_1 \cap F_2$.

Exercice 3.4 Dans \mathbf{R}^4 , on considère les vecteurs $a_1 = (0, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 0, 1, 1)$, $a_3 = (1, 1, 0, 1)$, $a_4 = (1, 1, 1, 0)$. Soit F le sous-espace vectoriel engendré par (a_1, a_2) et G celui engendré par (a_3, a_4) . Montrer que $\mathbf{R}^4 = F \oplus G$.

Exercice 3.5

On considère les deux sous-ensembles suivants de \mathbf{R}^4

$$E = \{(x, y, z, t) \in \mathbf{R}^4 : x + 4y - 5z - 2t = 0\} \text{ et } F = \{(x, y, z, t) \in \mathbf{R}^4 : 3x - y + t = 0\}.$$

1. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de \mathbf{R}^4 ; on admettra sans le démontrer que F est également un sous-espace vectoriel de \mathbf{R}^4 .
2. Déterminer une base de E , puis une base de F .
3. Déterminer une base de $E + F$, puis une base de $E \cap F$.
4. Soit (f_1, f_2, f_3) la base de F déterminée au 2). Expliciter un vecteur f_4 tel que (f_1, f_2, f_3, f_4) soit une base de \mathbf{R}^4 .

Exercice 3.6

Soit E un espace vectoriel, et F, G, H trois sous-espaces vectoriels de E tels que

$$F \cap G = F \cap H, \quad F + G = F + H, \quad G \subset H.$$

Montrer que $G = H$.

Exercice 3.7(*)

Quand F et G sont deux sous-espaces vectoriels distincts de \mathbf{R}^6 , tous les deux de dimension 4,

1. Quelle peut-être la dimension de $F + G$?
2. Quelle peut-être la dimension de $F \cap G$?

Exercice 3.8(*) Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de \mathbf{R}^3 , vérifiant $\dim F = 1$, $\dim G = 2$ et $F \not\subset G$. Montrer que $\mathbf{R}^3 = F \oplus G$.

Exercice 3.9(*) Soit E l'espace vectoriel des suites de réels, et soit $F \subset E$ l'ensemble des suites (u_n) qui vérifient la relation de récurrence

$$\forall n \geq 0 \quad u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n.$$

Déterminer toutes les suites (u_n) dans F telles que $u_0 = 1$ et $u_1 = -2$.

Exercice 3.10 Soit E l'ensemble des suites convergentes de nombres réels. Montrer que E est un sous-espace vectoriel de l'espace des suites réelles $\mathbf{R}^{\mathbf{N}}$. Montrer que l'ensemble des suites constantes et l'ensemble des suites qui convergent vers 0 sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

Exercice 3.11(*) Soit $E = \mathbf{R}_n[X]$ et $P \in E$.

1. Montrer que l'ensemble F_P des polynômes qui sont des multiples de P et dont le degré est inférieur ou égal à n est un sous-espace vectoriel de E . Quelle en est la dimension en fonction du degré de P ?
2. Soit $Q \in E$ un polynôme sans racine commune avec P , et tel que $\deg(P) + \deg(Q) = n + 1$. Montrer que $E = F_P \oplus F_Q$.
3. En déduire qu'il existe deux polynômes U, V tels que $UP + VQ = 1$.

Exercice 3.12

Soit $E = \mathbf{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$. On définit

$$E_a = \{P \in E : (X - a) \text{ divise } P\}$$

pour $a \in \mathbf{R}$. Montrer que si $a \neq b$ il existe un couple de réels (c, d) tels que $1 = c(X - a) + d(X - b)$. En déduire que $E = E_a + E_b$. La somme est-elle directe ?

Exercice 3.13 Soit E l'espace vectoriel sur \mathbf{R} des applications dérivables de \mathbf{R} vers \mathbf{R} . Soit F le sous-ensemble de E formé par les applications f telles que $f(0) = f'(0) = 0$.

1. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E .
2. Soit H l'ensemble des applications $x \mapsto ax + b$, où $(a, b) \in \mathbf{R}^2$. Vérifier que H est un sous-espace vectoriel de E et montrer que $F \oplus H = E$.