
Feuille d'exercices n° 1
RÉVISIONS D'ALGÈBRE LINÉAIRE

1 Espaces vectoriels – Bases

Exercice 1. Soient F et G des sous-espaces vectoriels de E .

1. Montrer que $F \cap G = F + G$ si et seulement si $F = G$.
2. Montrer que $F \cup G$ est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si $F \subset G$ ou $G \subset F$.

Exercice 2.

1. Soient $F = \{f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = f'(0) = 0\}$ et $G = \{x \mapsto ax + b, (a, b) \in \mathbb{R}^2\}$. Montrer que F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
2. Soit $H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0\}$. Montrer que H et $\text{Vect}(1, \dots, 1)$ sont des sous-espaces supplémentaires de \mathbb{R}^n .

Exercice 3.

1. Soient F et G deux sous espaces vectoriels d'un \mathbb{R} -espace vectoriel E de dimension finie n . Montrer que si $\dim F + \dim G > n$, alors $F \cap G$ contient un vecteur non nul.
2. Dans \mathbb{R}^4 , on considère les vecteurs $u = (1, 0, 1, 0)$, $v = (0, 1, -1, 0)$, $w = (1, 1, 1, 1)$, $x = (0, 0, 1, 0)$ et $y = (1, 1, 0, -1)$. Soit $F = \text{Vect}(u, v, w)$ et $G = \text{Vect}(x, y)$. Quelles sont les dimensions de $F, G, F + G$ et $F \cap G$?

Exercice 4. Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel et (e_1, \dots, e_n) une famille libre de vecteurs de E .

1. On pose $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = e_2 + e_3$ et $f_3 = e_3 + e_1$. Montrer que la famille (f_1, f_2, f_3) est libre.
2. On pose $g_1 = e_1 + e_2$, $g_2 = e_2 + e_3$, $g_3 = e_3 + e_4$ et $g_4 = e_4 + e_1$. Montrer que la famille (g_1, g_2, g_3) n'est pas libre.
3. On pose $h_1 = e_1 + e_2$, $h_2 = e_2 + e_3$, \dots , $h_{n-1} = e_{n-1} + e_n$ et $h_n = e_n + e_1$. La famille de vecteurs $(h_1, h_2, \dots, h_{n-1}, h_n)$ est-elle libre ?

Exercice 5. On considère les vecteurs suivants de \mathbb{R}^5 : $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que la famille (u_1, u_2, u_3) est libre.
2. Soit $v \in \mathbb{R}^5$. A quelle condition $v \in \text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$?
3. Trouver un supplémentaire de $E = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$ dans \mathbb{R}^5 .

2 Applications linéaires – Théorème du rang

Exercice 6. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. On considère l'application u :

$$\begin{aligned} u : \mathbb{R}^4 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\longmapsto (x + y + \alpha z + t, x + z + t, y + z) \end{aligned}$$

1. Montrer que u est une application linéaire de \mathbb{R}^4 dans \mathbb{R}^3 .
2. Déterminer le noyau et l'image de u .

Exercice 7. Pour chacune des applications qui suit, dire (en le justifiant) si elle est ou non linéaire :

1. $f : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X]$ où P' désigne le polynôme dérivé de P ,
 $P \longmapsto 2PP'$
2. $f : \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}_3[X]$ définie par “ $f(P)$ est le reste de la division euclidienne de P par $X^4 - 5X + 2$ (pour $P \in \mathbb{R}[X]$)”.

Exercice 8. Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie et u un endomorphisme de E .

1. Montrer que $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2)$ et que $\text{Im}(u^2) \subset \text{Im}(u)$.
2. (a) Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$ si et seulement si $\text{Im}(u) = \text{Im}(u^2)$.
(b) Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u^2)$ si et seulement si $E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$.
(c) Montrer que $E = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$ si et seulement si $\text{Im}(u) \subset \text{Im}(u^2)$.
3. (a) Donner des exemples d'endomorphismes vérifiant les propriétés équivalentes du 2.
(b) Les équivalences sont-elles encore vraies en dimension infinie ?

Exercice 9. Soient E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie n et u un endomorphisme de E . On suppose qu'il existe $x_0 \in E$ tel que $\mathcal{B} = (u(x_0), u^2(x_0), \dots, u^n(x_0))$ forme une base de E .

1. Montrer que u est bijective.
2. Montrer qu'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $u^n + a_{n-1}u^{n-1} + \dots + a_0\text{id}_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Exercice 10. Soit E un \mathbb{K} -espace vectoriel. On dit qu'un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est *nilpotent* s'il existe un entier naturel p tel que $u^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$. On dira que u est *ponctuellement nilpotent* si, pour tout $x \in E$, il existe un entier naturel p (qui dépend de x) tel que $u^p(x) = 0_E$.

1. Démontrer que tout endomorphisme nilpotent est ponctuellement nilpotent.
2. Démontrer que la réciproque est vraie si E est de dimension finie.
3. Donner un exemple d'endomorphisme ponctuellement nilpotent non nilpotent.
4. On suppose E de dimension finie n et soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent. Démontrer que $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
Indication : soit p le plus petit entier strictement positif tel que $u^p = 0$, montrer qu'il existe $x \in E$ tel que la famille $(x, u(x), u^2(x), \dots, u^{p-1}(x))$ soit libre.

Exercice 11. Soit E un \mathbb{R} -espace vectoriel de dimension finie. Montrer qu'il existe un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)$ si et seulement si la dimension de E est paire.

3 Matrices

Exercice 12. On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}_3[X]$ défini par :

$$u(P) = (1 - X^2)P'' - XP',$$

pour tout polynôme P de $\mathbb{R}_3[X]$.

1. Écrire la matrice de u dans la base canonique $(1, X, X^2, X^3)$ de $\mathbb{R}_3[X]$.
2. Déterminer des bases respectives de l'image et du noyau de u .

Exercice 13. On note $S(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid A = {}^t A\}$ l'ensemble des matrices symétriques de taille n et $A(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid A = -{}^t A\}$ l'ensemble des matrices antisymétriques.

1. Montrer que $S(n)$ et $A(n)$ sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. Calculer la dimension de chacun de ces sous-espaces vectoriels.
3. On considère l'endomorphisme ϕ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ défini par $\phi(A) = {}^t A$ pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Calculer la trace et le déterminant de ϕ .

Exercice 14. Soit u l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 dont la matrice dans la base canonique est $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -10 & 8 & -4 \\ -4 & 2 & -4 \\ 8 & -16 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit $E = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid u(x) = 2x\}$ et $F = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid u(x) = -2x\}$.

1. Montrer que E et F sont des sous-espaces vectoriels de \mathbb{R}^3 , en donner une base et leurs dimensions.
2. Montrer que $\mathbb{R}^3 = E \oplus F$.
3. Soit e_1 un vecteur directeur de E et (e_2, e_3) une base de F . Calculer la matrice de u dans la base (e_1, e_2, e_3) .

Exercice 15. Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$ définie par $u(x, y, z) = (x - y, y + z, x + y + 2z, x)$.

1. Ecrire la matrice A de u relativement aux bases canoniques de \mathbb{R}^3 et \mathbb{R}^4 .
2. Montrer que A est équivalente à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 16. Soit u l'endomorphisme de \mathbb{R}^3 dont la matrice dans la base canonique $\mathcal{B}_c = (e_1, e_2, e_3)$ est $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. On pose $\varepsilon_1 = (1; 1; 1)$, $\varepsilon_2 = (1; -1; 0)$, $\varepsilon_3 = (1; 0; 1)$ et $\mathcal{B} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$.

1. Montrer que \mathcal{B} constitue une base de \mathbb{R}^3 .
2. Écrire la matrice de u dans cette base.
3. Déterminer une base de $\text{Ker}u$ et de $\text{Im}(u)$.

Exercice 17. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On définit l'application :

$$\begin{aligned} u : \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ M &\longmapsto AM - MA \end{aligned}$$

1. Montrer que u est une application linéaire.
2. (a) En calculant $u(I_n)$, déterminer s'il existe des matrices A tels que l'application u soit injective.
(b) Existe-t-il des matrices A tels que l'application u soit surjective?
3. Soit $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix}$ où $a \in \mathbb{C}$. Donner la matrice de u dans la base canonique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

4 Déterminant – Inversibilité

Exercice 18. Calculer les déterminants suivants :

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 5 & 2 & 7 \\ 9 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & n & \cdots & \cdots & n \\ n & 2 & n & \cdots & n \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & n \\ n & \cdots & \cdots & n & n \end{vmatrix}$$

Exercice 19. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A_n = \begin{pmatrix} a & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 \\ a & \cdots & \cdots & a \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On note $D_n = \det A_n$.

1. Calculer D_2 et D_3 .
2. Trouver une relation de récurrence entre D_n et D_{n-1} .
3. En déduire une expression de D_n en fonction de n .
4. Calculer le rang de la matrice A_n en fonction de a .

Exercice 20. On note $GL_n(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \mid M^{-1} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})\}$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que $M \in GL_n(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det M = \pm 1$.

Exercice 21. Calculer l'inverse des matrices carrées suivantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, et $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 22. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $A^2 - 3A + 2I_2$.
2. En déduire que la matrice A est inversible et expliciter son inverse.
3. Pour tout entier $n \geq 2$, déterminer le reste de la division euclidienne de X^n par $X^2 - 3X + 2$.
4. En déduire A^n pour tout $n \geq 2$.

Exercice 23. Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on ait $\sum_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} |a_{i,j}| < |a_{i,i}|$.

Montrer que A est inversible.